

Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin)

En-stegsspädning:	Doktacillin		Sterilt Vatten		INJ-INF LÖ
	1 g	+		=	100 mg/mL
	1 st		10 mL		10 mL

En-stegsspädning:	Doktacillin		Sterilt Vatten		INJ-INF LÖ
	2 g	+		=	100 mg/mL
	1 st		20 mL		20 mL

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringsätt

Intravenös injektion: Obs! Får inte ges snabbare än 10 mg/kg/min (=0,1 mL/kg/min), dock max 100 mg/min (=1 mL/min).

Vanlig indikation och dos

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-01-30 16:32:15
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-30 16:32:12
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2142
ID/spårnummer: 1895
Giltig fr o m: 2017-01-30 16:32:12
Utskriftsdatum: 2017-02-10

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin)

Systemisk bakteriell infektion med bakterier känsliga för ampicillin

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 32: 50 mg/kg x 2

Gestationsålder vid födsel mer än vecka 32: 50 mg/kg x 3

Dag 8 - 28:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 32: 50 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel mer än vecka 32: 50 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 25 - 50 mg/kg x 4

Dosen kan fördubblas vid allvarlig infektion.

Max 2 g/dos x 6 = 12 g/dygn

Behandlingstid Listeria sepsis: 10 - 14 dagar

Bakteriell meningit eller allvarligt septiskt påverkat barn

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 32: 100 mg/kg x 2

Gestationsålder vid födsel mer än vecka 32: 100 mg/kg x 3

Dag 8 - 28:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 32: 100 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel mer än vecka 32: 100 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 50 - 100 mg/kg x 4 - (6)

Max 2 g/dos x 6 = 12 g/dygn.

Behandlingstid Listeria meningit: 14 - 21 dagar

Rimlig dos för barn

1 kg

5 kg

10 kg

50 kg

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-01-30 16:32:15

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-30 16:32:12

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2142

ID/spårnummer: 1895

Giltig fr o m: 2017-01-30 16:32:12

Utskriftsdatum: 2017-02-10

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL

(Doktacillin)

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
50 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	
100 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	
max 2 g				20 mL

Hållbarhet preparat:

Doktacillin (registrerad produkt)
● 100 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Hållbar: 1 timme i rumstemperatur

Övrig information

Enligt Fass-text för Doktacillin ska färdigberedda lösningar användas omedelbart. Utifrån uppgifter i andra handböcker har vi dock underlag för att sätta en timmes hållbarhet i rumstemperatur.

Nyberedd injektionslösning kan ha en gulaktig färg.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/.htm>

Internetadress Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om Neonatal Sepsis

<http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso--sjukvard/Behandlings-rekommendationer/Behandlingsrekommendation--listan/Neonatal-sepsis/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2142

Substansspecifika uppgifter

Ampicillin, J01CA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=ID1KAJWU7SMW6BMSR&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-01-30 16:32:15
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-30 16:32:12
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2142
ID/spårnummer: 1895
Giltig fr o m: 2017-01-30 16:32:12
Utskriftsdatum: 2017-02-10

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

