

Meropenem intravenös inj 50 mg/mL (ex Meronem)

Meropenem (vattenfri)

En-stegspädning:	Meropenem (ex Meronem)		Sterilt Vatten		INJ-INF LÖ
	500 mg	+		=	50 mg/mL
	1 st		10 mL		10 mL

En-stegspädning:	Meropenem (ex Meronem)		Sterilt Vatten		INJ-INF LÖ
	1 g	+		=	50 mg/mL
	1 st		20 mL		20 mL

Beredningsinstruktion

- Lösningar färdiga att användas är klara, färglösa eller svagt gula.
- Lösningen ska skakas före användning.

Hållbarhet preparat:

Meropenem (ex Meronem) (Registrerad Produkt)

- 50 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning, Hållbar: 2 tim rumstemperatur och 12 tim kyl. Hållbarheten skiljer sig från FASS-text och har bedömts farmaceutiskt utifrån flera olika källor.

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., Cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner

Administreringsätt

Intravenös injektion (3-5 min): Neo och Barn: doser upp till 20 mg/kg (max 1 g) ges som intravenös injektion under 3 - 5 min.

Intravenös infusion: Neo och Barn: doser över 20 mg/kg ges som intravenös infusion under ca 15 - 30 min.

Vanlig indikation och dos

Systemisk bakteriell infektion

0 - 1 mån: 20 - (40) mg/kg x 2 - 3

1 mån - 12 år (vikt under 50 kg): 20 mg/kg x 3

12 - 18 år (vikt över 50 kg): (0,5) - 1 g x 3

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-10-16 15:10:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-10-23 08:49:33

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2176

ID/spårnummer: 902

Giltig fr o m: 2015-10-23 08:49:33

Utskriftsdatum: 2015-10-23

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Meropenem intravenös inj 50 mg/mL (ex Meronem)

Meropenem (vattenfri)

Meningit

0 - 12 år (vikt under 50 kg): 40 mg/kg x 3

12 - 18 år (vikt över 50 kg): 2 g x 3

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
20 mg/kg/dos	0,4 mL	2 mL	4 mL	20 mL
40 mg/kg/dos	0,8 mL	4 mL	8 mL	40 mL

Övrig information

- För intravenös infusion kan ordinerad dos sättas till valfri mängd 0,9% NaCl (om tillsats till infusionspåse till konc 2-20 mg/ml kan hållbarheten sättas till 4 tim rumstemperatur) eller 5% glukos (om tillsats till infusionspåse till konc 2-20 mg/ml kan hållbarheten sättas till 1 tim rumstemperatur) för att få en hanterbar volym.

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2012-09-15

<http://www.fass.se/LIF/product?8&userType=0&nplid=19950127000033&DocTypeID=3&UserTypeID=0>

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2014-04-23

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Trissel , Hämtat: 2012-10-22

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-10-16 15:10:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-10-23 08:49:33

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2176

ID/spårnummer: 902

Giltig fr o m: 2015-10-23 08:49:33

Utskriftsdatum: 2015-10-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

