

Nebcina, IV inf  
Tobramycin 0,8 mg/ml  
enl spädn-schema

<i>inj vätska</i>			<i>IV inf</i>
40 mg/ml		NaCl 9mg/ml alt glukos 50 mg/ml	0,8 mg/ml
2 ml	+	98 ml	= 100 ml

---

Administrering: Infusion under 20 till 60 min

Hållbarhet efter iordningställande: 12 h;

Varunummer: 418848, Nebcina injv,lö 40mg/ml, 10 x 2 ml

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt lokala läkemedelshanteringsriktlinjer

---

Indikation: Systemisk bakteriell infektion

Vanlig dos: Barn: 1 v - 3 mån: 2 mg/kg x 3

Barn: 3 mån - 12 år: 2,5 mg/kg x 3

Barn och ungdomar: 12-18 år: 3 mg/kg x 3.

Vid svåra infektioner kan 5 mg/kg x 3 ges tills förbättring inträder, därefter sänks dosen till 3 mg/kg (underhållsdos).

Behandling styrs efter serumkoncentrationen särskilt hos barn med nedsatt njurfunktion. Vid nedsatt njurfunktion skall dosjustering ske.

Önskad serumkoncentration 4-12 mg/L.

Den maximala serumkoncentrationen skall ej överskrida 12 mg/L