

Perorala och rektala läkemedel

Betapred, PO, tablett
Betametason 0,5 mg

Beredningsinstruktion: Tabletterna löses upp i lite (ca 5-10 ml) vatten och löses fullständigt inom 1-2 minuter.

Alternativt kan tabletterna intas utan vatten, men skall då söndertuggas väl.

Varunummer: 7997, Betapred tabl 0,5mg, 30 st

Källa: FASS

Indikation: Akut behandling av astma/obstruktiva andningsbesvär, pseudokrupp, inflammationshämmande.
Lindriga fall av anafylaxi.

Vanlig dos: Barn under 10 kg: 3 mg = 6 tabletter
Barn över 10 kg: 4 mg = 8 tabletter

Pseudokrupp (enligt FASS):
Barn under 10 kg: 4 mg = 8 tabletter
Barn över 10 kg: 6 mg = 12 tabletter
Tabletterna ges som engångsdos.

Klinisk effekt ej märkbar förrän efter flera timmar.

Vid svårt astmaanfall eller lång försämringsperiod kan Betapred ges som kortkur, 3 - 5 dagar med 2 mg (= 4 tabletter) per dag. Risk för systemiska biverkningar med upprepade kortkurer, särskilt om kortare än 2 månaders intervall mellan kurena.

Betapred, PO, tablett
Betametason 0,5 mg

Referens - Det blåa fältet innehåller klickbar länk till referensen

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus: PM Akut
astma

<http://gamlainuti.karolinska.se/upload/202431/Astma%20PM%20AKUT.pdf>