

## Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred)

---

### Administreringsätt

Oralt: Tabletterna löses upp i lite (ca 5 - 10 mL) vatten och löses fullständigt inom 1 - 2 minuter.

Alternativt kan tabletterna intas utan vatten, men då ska de söndertuggas väl. Risker för lokal irritation på magslemhinnan blir dock större än vid upplösning i vatten.

Enteralt i sond: Går att ge i sond efter upplösning i lite vatten (5 - 10 mL).

---

### Vanlig indikation och dos

#### Akut behandling astma/obstruktiva andningsbesvär

Under 10 kg: 6 tabletter (3 mg)

Över 10 kg: 8 - (10) tabletter (4 - 5 mg)

Vid långdragna/svåra besvär ges ytterligare 4 tabletter (2 mg) i 3 - (5) dagar.

#### Allergisk reaktion/anafylaxi

Under 5 år: 6 tabletter (3 mg)

Över 5 år: 10 tabletter (5 mg)

#### Viruskrupp

Under 10 kg: 6 tabletter (3 mg)

Över 10 kg: 8 - (10) tabletter (4 - 5 mg)

---

### Hållbarhet preparat:

Betapred (registrerad produkt)

● 0,5 mg, Tablett

Hållbar: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

---

### Övrig information

Vid viruskrupp är Dexametason oralt ett alternativ.

Risk för systemiska biverkningar med upprepade kortkurer, särskilt om kortare

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-10-11 10:41:32  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-28 14:47:29  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2445  
ID/spårnummer: 1646  
Giltig fr o m: 2016-10-28 14:47:29  
Utskriftsdatum: 2016-11-10

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Betametason oralt 0,5 mg

## (ex Betapred)

än 2 månaders intervall mellan kurerna.

---

### Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, behandlingsrekommendation Astma

<https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso--sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation--listan/Astma/>

Internetadress Svenska Barnläkarförening, Barnallergisektionen, riktlinje anafylaxi/anafylaktisk reaktion

[http://www.barnallergisektionen.se/stenciler\\_nya06/D1%20anafylaxi.pdf](http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/D1%20anafylaxi.pdf)

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Barnallergisektionen, riktlinje astmaanfall - akutbehandling

[http://www.barnallergisektionen.se/stenciler\\_nya06/d9\\_akut%20astma.pdf](http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d9_akut%20astma.pdf)

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

SLL [http://sileped01.ds.sll.se/eped\\_extra/lokalreferens.html#2445](http://sileped01.ds.sll.se/eped_extra/lokalreferens.html#2445)

Sjunet [http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2445](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2445)

---

### Substansspecifika uppgifter

Betamethasone, H02AB01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCAU9DR0VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-10-11 10:41:32  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-28 14:47:29  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2445  
ID/spårnummer: 1646  
Giltig fr o m: 2016-10-28 14:47:29  
Utskriftsdatum: 2016-11-10

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

