

Betametason oralt

(ex Betapred) tablett 0,5 mg

Administreringsätt

Oralt: Tabletterna löses upp i lite (ca 5 - 10 mL) vatten och löses fullständigt inom 1 - 2 minuter.

Alternativt kan tabletterna intas utan vatten, men då ska de söndertuggas väl. Risker för lokal irritation på magslemhinnan blir dock större än vid upplösning i vatten.

Enteralt i sond: Går att ge i sond efter upplösning i lite vatten (5 - 10 mL).

Vanlig indikation och dos

Akut behandling astma/obstruktiva andningsbesvär

Barn under 10 kg: 6 tabletter (3 mg)

Barn över 10 kg: 8 - (10) tabletter (4 - 5 mg)

Vid långdragna/svåra besvär ges ytterligare 4 tabletter (2 mg) i 3 - (5) dagar.

Allergisk reaktion/anafylaxi

Barn under 6 år: 6 tabletter (3 mg)

Barn från 6 år: 10 tabletter (5 mg)

Viruskrupp

Barn under 10 kg: 6 tabletter (3 mg)

Barn över 10 kg: 8 - (10) tabletter (4 - 5 mg)

Hållbarhet preparat:

Betapred (registrerad produkt)

0,5 mg, Tablett

Hållbar: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Övrig information

Vid viruskrupp är Dexametason oralt ett alternativ.

Risk för systemiska biverkningar med upprepade kortkurer, särskilt om kortare

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-12-16 16:10:13

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-19 13:28:36

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2445

ID/spårnummer: 1802

Giltig fr o m: 2016-12-19 13:28:36

Utskriftsdatum: 2016-12-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Betametason oralt

(ex Betapred) tablett 0,5 mg

än 2 månaders intervall mellan kurerna.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Anafylaxi Rekommendationer för omhändertagande och behandling, utarbetat på uppdrag av Svenska Föreningen för Allergologi

http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi_sept_2015.pdf

Internetadress Läkemedelsverket, behandlingsrekommendation Astma

<https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso--sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation--listan/Astma/>

Internetadress Svenska Barnläkarförening, Barnallergisektionen, riktlinje anafylaxi/anafylaktisk reaktion

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/D1%20anafylaxi.pdf

Internetadress Svenska Barnläkarförening, Barnallergisektionen, riktlinje astmaanfall - akutbehandling

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d9_akut%20astma.pdf

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

SLL http://sllped01.ds.sll.se/eped_extra/lokalreferens.html#2445

Sjunet http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2445

Substansspecifika uppgifter

Betamethasone, H02AB01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POCAU9DR0VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-12-16 16:10:13

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-19 13:28:36

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2445

ID/spårnummer: 1802

Giltig fr o m: 2016-12-19 13:28:36

Utskriftsdatum: 2016-12-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

