



Betametason oralt

(ex Betapred) tablett 0,5 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletterna löses upp i lite (ca 5 - 10 mL) vatten, löses fullständigt inom 1 - 2 minuter.

Alternativt kan tabletterna intas utan vatten, men då ska de söndertuggas väl. Risken för lokal irritation på magslemhinnan blir dock större än vid upplösning i vatten.

Enteralt i sond: Går att ge i sond efter upplösning i lite vatten (5 - 10 mL).

ÖVRIG INFORMATION

Vid viruskrupp är dexametason oralt ett alternativ.

Risk för systemiska biverkningar med upprepade kortkurer, särskilt om kortare än 2 månaders intervall mellan kurerna.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Betametason (registrerad produkt)

0,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Allergisk reaktion/anafylaxi

Barn under 6 år: 6 tabletter (3 mg)

Barn från 6 år: 10 tabletter (5 mg)

Andningsbesvär i övre- och nedre luftvägar t.ex. akut astma, viruskrupp

Barn under 10 kg: 4 - 6 tabletter (2 - 3 mg)

Barn över 10 kg: 8 - (10) tabletter (4 - 5 mg)

Vid långdragna/svåra besvär kan ytterligare 4 tabletter (2 mg) i 3 - (5) dagar ges.

Efter neurokirurgiskt ingrepp

Barn 1 mån - 18 år:

Dag 1 - 2: 4 tabletter (2 mg) x 2

Dag 3 - 4: 2 tabletter (1 mg) x 2

Dag 5 - 6: 1 tablett (0,5 mg) x 2

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Anafylaxi Rekommendationer för omhändertagande och behandling, utarbetat på uppdrag av Svenska Föreningen för Allergologi

http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi_sept_2015.pdf

Internetadress Läkemiddelsverket, behandlingsrekommendation Astma

<https://lv.se/astma>

Internetadress Svenska Barnläkarförening, Barnallergisektionen, riktlinje anafylaxi/anafylaktisk reaktion

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/D1%20anafylaxi.pdf

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Barnallergisektionen, riktlinje astmaanfall - akutbehandling

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d9_akut%20astma.pdf

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2445

Betametason oralt

(ex Betapred) tablett 0,5 mg



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-04-16
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-17
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 2445
Versionsnummer, major: 3
Giltig fr o m: 2018-04-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT