

Ibuprofen (ex Brufen, Ipren) PO, PR

Ibuprofen

OBS! Olika styrkor och beredningsformer finns. Detta blad gäller för Ibuprofeninnehållande preparat, oral lösning (20 resp. 40 mg/ml), tabletter (200, 400 resp 600 mg) samt suppositorier (60 mg)

Hållbarhet preparat:

Ibuprofen (Ipren, Brufen, Nurofen m fl) (Registrerad Produkt)

- 20 mg/mL, Oral suspension, Hållbar: Öppnad flaska ska användas inom 12 månader (Brufen, ingen info ang. Ipren)
- 40 mg/mL, Oral suspension, Hållbar: Öppnad flaska ska användas inom 6 månader (Nurofen)

Administreringsätt

Oralt

Rektalt

Vanlig indikation och dos

Oralt mot smärta och/eller feber

Barn från 3 mån: 5 - 10 mg/kg x 3-4, max 30 mg/kg/dygn

Barn 6 - 12 år (över 20 kg): 200 mg x 1-3, max 2400 mg/dygn

Barn över 12 år: 200 - 400 mg x 1-3, max 2400 mg/dygn

Procedursmärta (engångsdos):

Från 3 mån: 7 mg/kg oralt eller rektalt, max 600 mg/dos

Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Från 3 mån: 7,5-10 mg/kg x 3-4, max 60 mg/kg/dygn eller max 2400 mg/dygn

Postoperativ smärtlindring

Från 3 mån: 4-(10) mg/kgx4

Övrig information

Maximal analgetisk effekt inträder efter ca 2 h.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2014-09-22

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-24 14:19:41

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 14:19:37

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2447

ID/spårnummer: 608

Giltig fr o m: 2015-03-24 14:19:41

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ibuprofen (ex Brufen, Ipren) PO, PR

Ibuprofen

OBS! Olika styrkor och beredningsformer finns. Detta blad gäller för Ibuprofeninnehållande preparat, oral lösning (20 resp. 40 mg/ml), tabletter (200, 400 resp 600 mg) samt suppositorier (60 mg)

FASS , Hämtat: 2014-09-22

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus PM, Sedering och analgesi vid ingrepp och undersökningar, Hämtat: 2014-09-22

[http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/F680B4D011CD1068C1257A310040C5F5/\\$File/JKUR8VVFVP.docx?OpenElement](http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/F680B4D011CD1068C1257A310040C5F5/$File/JKUR8VVFVP.docx?OpenElement)

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2014-09-17

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-24 14:19:41

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 14:19:37

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2447

ID/spårnummer: 608

Giltig fr o m: 2015-03-24 14:19:41

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

