



Levotyroxin oralt

(ex Levaxin) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 25, 50, 100 mikrog (Euthyrox)

Tablett 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mikrog (Levaxin)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Dosen tas så standardiserat som möjligt i förhållande till födoingtag. Hela dygnsdosen tas på morgonen, gärna 30 min före frukost. Se även Övrig information.

Levaxin 25 mikrog saknar brytskåra, olämplig vid doser mindre än 25 mikrog.

Euthyrox 25 mikrog har brytskåra och kan delas, lämpar sig även vid doser om 12,5 mikrog.

Oralt:

Vid behov kan tabletterna krossas och slammas upp i lite vatten, t.ex. ca 2 mL till en tablett 25 mikrog. Hela dosen ska ges (delmängd kan inte tas) och administreringen ska ske direkt efter uppslamningen.

Enteralt i sond:

Tabletten kan krossas och slammas upp i ca 5 - 10 mL vatten, skaka i 3 - 5 min tills tabletten löst sig.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Levotyroxin (registrerad produkt)

25 mikrog, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Gäller båda fabrikaten och alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kongenital hypotyreos

Nyfödda: Initialt 10 - 15 mikrog/kg x 1, max 50 mikrog/DOS

Vanlig underhållsdos: 20 - 50 mikrog x 1

Hypotyreos

Barn 1 - 11 mån: Initialt 5 mikrog/kg x 1, max 50 mikrog/DOS

Barn 1 - 5 år: Initialt 5 - 6 mikrog/kg x 1

Barn 6 - 10 år: Initialt 3 - 4 mikrog/kg x 1

Barn över 10 år: Initialt 2 - 3 mikrog/kg x 1

Vanlig startdos är 50 mikrog x 1. Dosen anpassas sedan utifrån provsvar och klinik. Eventuell dosökning görs var 2:a - 4:e vecka tills normaliserad metabolism erhålls.

Vid grav hypotyreos är startdosen 25 mikrog x 1, fortsatt dosering i samråd med barnendokrinolog.

Tyreotoxikos

Behandling med levotyroxin kan bli aktuell i vissa fall, doseras då enligt indikationerna ovan.

ÖVRIG INFORMATION

Dosintag på morgonen är en fördel i förhållande till provtagning då det ska ha gått 24 tim från senaste dos vid provtagningstillfället, dvs dosen på provtagningsdagen tas inte förrän efter provtagningen.

Absorptionen av levotyroxin kan hämmas av samtidigt intag av läkemedel eller föda innehållande kalcium, aluminium eller järn. Intag bör därför ske med 4 timmars mellanrum.

De godkända produkterna innehåller gelatin från gris. Om vårdnadshavare inte tillåter läkemedel innehållande gelatin finns licensförskrivning av gelatinfritt läkemedel som alternativ. Ex. "L-Tyroxin Henning" i styrkorna 50 och 75 mikrog från Tyskland.





Levotyroxin oralt

(ex Levaxin) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Svenska Barnläkarföreningen Delförening för endokrinologi och diabetes - Kongenital hypotyreos

<https://endodiab.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Delförening för endokrinologi och diabetes - Tyreotoxikos

<https://endodiab.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2468

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-08-04

ePedID: 2468

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-05

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-08-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT