

Hydrokortison (ex Mildison Lipid) kräm 1%

Hydrocortisone

Administreringsätt

Utvärtes

Vanlig indikation och dos

Eksem

Applicera ett tunt lager 1-2 gånger dagligen tills förbättring. Minska därefter dosen till 1 gång per dygn. Kombinera gärna behandlingen med mjukgörande kräm.

Extravasering av Cytostatika

Applicera ett tunt lager på det drabbade området var 6:e timme upp till 7 dagar eller tills förbättring.

Referens/Länk

BNF-C Topical Hydrocortisone 1 %, Hämtat: 2015-04-29

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP14938-hydrocortisone.htm?q=hydrocortisone&t=search&ss=text&p=4>

FASS Mildison Lipid 1 %, Hämtat: 2015-04-29

<http://www.fass.se/LIF/product?12&userType=2&nplid=19880916000046&docType=6>

Internetadress Chemotherapy extravasation guideline, Hämtat: 2015-04-29

<http://www.beatson.scot.nhs.uk/content/mediaassets/doc/Extravasation%20guidance.pdf>

Internetadress Management of Extravasation of Cytotoxic Drugs in Children, Hämtat: 2015-04-29

<http://www.rcht.nhs.uk/DocumentsLibrary/RoyalCornwallHospitalsTrust/Clinical/CancerServices/PaediatricExtravasationPolicy.pdf>

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2015-05-11

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-04-29 08:53:24

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-05-11 13:16:43

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2474

ID/spårnummer: 691

Giltig fr o m: 2015-05-11 13:16:43

Utskriftsdatum: 2015-05-11

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

