



Makrogol + tillsatser oralt

(ex Movicol)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Pulver till oral lösning i dospåse (ex Laxiriva, Movicol)
Oral lösning i dospåse (Movicol)

Beredningsinstruktion:

Pulver till oral lösning: Varje dospåse löses upp i ca ett halvt glas vatten. Rör om tills allt pulver löst sig och vätskan är klar eller lätt grumlig.

Oral lösning i dospåse: Klar att administrera, behöver inte spädas med vatten

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond: Dospåse upplöst i vatten

ÖVRIG INFORMATION

Till patienter under 12 år rekommenderas Movicol Junior eller Laxido Junior. Movicol Junior/ Laxido Junior har exakt samma innehåll som Movicol/ Laxido, fast halva dosen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Movicol (registrerad produkt)

1 st, Oral lösning

HÅLLBAR: Iordningställd lösning kan förvaras övertäckt i kylskåp max 6 timmar.

1 st, Oral lösning, endosbehållare

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling av kronisk förstoppning

Barn och ungdomar över 12 år: 1 dospåse 1 - 3 gånger dagligen
Vid långvarig behandling kan dosen minskas till 1 - 2 dospåsar dagligen.

Lösning av fekalom

8 dospåsar dagligen. Inta samtliga dospåsar inom 6 timmar.
Vid behandling av fekalom kan 8 dospåsar lösas upp i 1 liter vatten.

REFERENS/LÄNK

FASS Movicol

<http://www.fass.se/LIF/product?20&userType=2&nplId=20051228000031&docType=6>

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2477

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-04-18

ePedID: 2477

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-20

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT