



Makrogol + tillsatser oralt

(ex Movicol)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Pulver till oral lösning i dospåse (ex Laxiriva, Movicol)
Oral lösning i dospåse (Movicol)

Beredningsinstruktion:

Pulver till oral lösning: Varje dospåse löses upp i ca ett halvt glas vatten (ca 1 dL). Rör om tills allt pulver löst sig och vätskan är klar eller lätt grumlig.

Oral lösning i dospåse: Klar att administrera, behöver inte spädas med vatten

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: blandas med vatten eller strös på mat

Enteralt i sond: dospåse upplöst i vatten

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

ex Movicol (registrerad produkt)

Pulver till oral lösning, dospåse

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

Oral lösning

HÅLLBAR: Iordningställd lösning kan förvaras övertäckt i kylskåp max 24 timmar.

Oral lösning, endosbehållare

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doseringen avser dospåse Movicol/Laxiriva (för dosering av JUNIOR påse, se annan instruktion).

Till barn under 2 år rekommenderas i första hand behandling med laktulos.

Obstipation

Barn 1 - 6 år: 0,5 dospåse per dag, kan ökas successivt till 2 dospåsar per dag.

Barn 7 - 11 år: 1 dospåse per dag, kan ökas successivt till 2 - 3 dospåsar per dag.

Hela dygnsdosen bör om möjligt ges på morgonen.

Barn över 12 år: 1 dospåse 1 - 3 gånger dagligen

Vid långvarig behandling kan dosen minskas till 1 - 2 dospåsar dagligen.

Behandlingen bör omprövas var 3:e månad.

Lösning av fekalom

Barn 5 - 18 år:

Dag 1: 2 dospåsar

Dag 2: 3 dospåsar

Dag 3: 4 dospåsar

Dag 4 : 5 dospåsar

Dag 5 - 7 : 6 dospåsar/dygn

Det dagliga antalet dospåsar ska intas vid skilda tillfällen inom 12 timmar.

ÖVRIG INFORMATION

Movicol/ Laxido har exakt samma innehåll som Movicol Junior/Laxido Junior fast dubbla dosen.



Makrogol + tillsatser oralt (ex Movicol)



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Riktlinje för primärvården, Förstoppning hos barn

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/barn-och-ungdom/ako/forstoppning-hos-barn/>

Internetadress Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsmaterial.

Läkemedelskommittéerna i Uppsala - Örebroregionen (7 landsting)

<https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/behandlingsstod/lakemedel/baslakemedel/rekommenderade-lakemedel-for-barn-2019-2020---bakgrundsmaterial-190109.pdf>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk/forstoppning/>

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2477

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-12-18

ePedID: 2477

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-18

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-12-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT