



Tobramycin inhalation 300 mg

(ex Tobi)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lösning för nebulisator 300 mg/5 mL (Tobi)

Lösning för nebulisator 300 mg/4 mL (Bramitob)

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Undvik direktkontakt med produkten.

ADMINISTRERING

Inhalation: ca 15 min

Läkemedlet ska inte spädas eller blandas med något annat läkemedel i nebulisatorn. Inhaleras med hjälp av eFlow eller motsvarande utrustning. Utandningsfilter ska användas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Bramitob (registrerad produkt)

300 mg/4 mL, Lösning för nebulisator

Förvaras i kylskåp. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Påsarna, oöppnade eller öppnade, kan förvaras vid högst 25 °C i högst 3 mån. Öppnad endosbehållare ska kasseras efter första uttag, sparas ej.

Tobi (registrerad produkt)

300 mg/5 mL, Lösning för nebulisator

Förvaras i kylskåp. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Påsarna, oöppnade eller öppnade, kan förvaras vid högst 25 °C i högst 28 dagar. Öppnad ampull ska kasseras efter första uttag, sparas ej.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordinerars av cystisk fibros-läkare.

Luftvägsinfektion vid cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 300 mg x 2 (Tobi: 5 mL x 2, Bramitob: 4 mL x 2)

Inhaleras efter sedvanlig inhalationsbehandling och andningsgymnastik. Dosintervallet bör vara 12 tim, men minst 6 tim.

Patientens förmåga att ha rätt inhalationsteknik styr vid vilken ålder som behandlingen kan sättas in.

Behandlingstid: 28 dagar. Vid kronisk kolonisering av bakterier ges tobramycin on/off, dvs 4 veckor med behandling, 4 veckor utan. Detta upprepas tills annat ordinerars.

ÖVRIG INFORMATION

Serumkoncentrationen av tobramycin bör kontrolleras hos patienter med känd eller misstänkt hörsel- eller njurfunktionsnedsättning samt hos patienter som samtidigt får parenteral behandling med aminoglykosid.

Lösningen har svagt gul färg, viss variation i färg kan förekomma. Detta är normalt förutsatt att läkemedlet har förvarats som det ska.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Tobramycin inhalation 300 mg (ex Tobi)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2518

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-04-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT