



## Tobramycin inhalation 300 mg/5 mL = 60 mg/mL

(Tobi)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lösning för nebulisator 300 mg/5 mL, ska ej spädas

### ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Inhalation:

Läkemedlet ska inte spädas eller blandas med något annat läkemedel i nebulisatorn.

Inhaleras med hjälp av eFlow eller motsvarande utrustning. Utandningsfilter ska användas.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Tobramycin (registrerad produkt)

300 mg/5mL, Lösning för nebulisator

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Kan förvaras vid högst 25 °C i högst 28 dagar. Öppnad ampull ska kasseras efter första uttag, sparas ej.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordinerars av cystisk fibros-läkare.

#### Luftvägsinfektion vid cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 300 mg x 2 (5 mL x 2)

Inhaleras efter sedvanlig inhalationsbehandling och andningsgymnastik. Dosintervallet bör vara 12 tim, men minst 6 tim.

Patientens förmåga att ha rätt inhalationsteknik styr vid vilken ålder som behandlingen kan sättas in.

Behandlingstid: 28 dagar. Vid kronisk kolonisering av bakterier ges tobramycin on/off, dvs 4 veckor med behandling, 4 veckor utan. Detta upprepas tills annat ordinerars.

### ÖVRIG INFORMATION

Serumkoncentrationen av tobramycin bör kontrolleras hos patienter med känd eller misstänkt hörsel- eller njurfunktionsnedsättning samt hos patienter som samtidigt får parenteral behandling med aminoglykosid.

Lösningen har svagt gul färg, viss variation i färg kan förekomma. Detta är normalt förutsatt att läkemedlet har förvarats som det ska.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)



# Tobramycin inhalation 300 mg/5 mL = 60 mg/mL (Tobi)



## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-02-21

ePedID: 2518

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-02-21

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-02-21

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**