



Glukagon inj 1 mg/mL

(Glucagon) flera administreringsvägar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Pulver och vätska till injektionsvätska, förfylld spruta 1 mg (HypoKit)

Alt. 2: Pulver och vätska till injektionsvätska 1 mg

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 1 - 2

Glukagon		Medföljande vätska		INJ LÖ
1 mg				1 mg/mL
1 st	+	1 mL	=	1 mL

Beredningsinstruktion:

Alt. 1: Spruta ner vatten för injektionsvätskor från medföljande spruta i flaskan med glukagonpulver. Lös upp pulvret genom att försiktigt snurra på flaskan. Dra tillbaka lösningen i sprutan.

Alt. 2: Dra upp vatten för injektionsvätskor (medföljande vätska) i en engångsspruta och spruta ner det i flaskan med glukagonpulver. Lös upp pulvret genom att försiktigt snurra på flaskan. Dra tillbaka lösningen i sprutan.

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion

Subkutan injektion

Intravenös injektion

RIMLIG DOS för Glukagon inj 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
30 mikrog/kg, max 1 mg	0,03 mL	0,15 mL	0,3 mL	1 mL
200 mikrog/kg=0,2 mg/kg	0,2 mL	1 mL	-	-

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Allvarlig hypoglykemi, utanför sjukhus

Barn under 25 kg eller under 6 - 8 år: 0,5 mg (0,5 mL), markerat 1/2 på sprutan.

Barn från 25 kg eller från 6 - 8 år: 1 mg (1 mL), markerat 1/1 på sprutan.

Ges subkutant eller intramuskulärt.

Om ingen effekt ses inom 10 minuter måste glukos tillföras intravenöst.

Hyperinsulinism

Nyfödda: 0,1 - 0,2 mg/kg, vanligen 0,5 mg, max 1 mg

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg

Ges intramuskulärt eller intravenöst.

Glukagonstimulationstest för utvärdering av tillväxthormonsekretion

Engångsdos: 30 mikrog/kg, max 1 mg

Ges subkutant eller intramuskulärt.

ÖVRIG INFORMATION

Då glukagon är instabil i lösning ska den administreras direkt efter iordningställande och får inte ges som intravenös infusion.





Glukagon inj 1 mg/mL

(Glucagon) flera administreringsvägar

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Glukagon (registrerad produkt)

1 mg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Förvaras i kylskåp. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.

1 mg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Förvaras i kylskåp. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas. Kan förvaras i rumstemperatur (max 25 °C) i upp till 18 mån.

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Får ej sparas, används direkt.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Delförening för endokrinologi och diabetes - Handläggning av hypoglykemi hos barn med diabetes

<https://endodiab.barnlakarforeningen.se/vardprogram/diabetes/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Hypoglykemi vårdprogram

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2525

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2525

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-04-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT