



## Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt

(ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter

**Högriskläkemedel - har två aktiva substanser.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Bactrim 400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim  
Bactrim forte 800 mg sulfametoxazol + 160 mg trimetoprim  
Eusaprim forte 160 mg trimetoprim + 800 mg sulfametoxazol

Bactrim forte och Eusaprim forte är utbytbara med varandra.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Bactrim och Bactrim forte kan delas för att få två lika stora doser. Eusaprim forte ska endast delas för att underlätta nedsväljning.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Bactrim (registrerad produkt)

1 st, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackning. Gäller även Bactrim forte.

#### Eusaprim Forte (registrerad produkt)

1 st, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Bakteriell infektion med bakterier känsliga för sulfametoxazol och trimetoprim

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2 eller 0,5 tablett Bactrim forte x 2

Barn över 12 år: 2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Denna dosering motsvarar en ungefärlig mängd av  
30 mg sulfametoxazol/kg/dag och 6 mg trimetoprim/kg/dag.

Maxdos: 3 tabletter Eusaprim/Bactrim forte per dag

Behandlingstid: vanligen 10 dagar

#### Kattbett, vid penicillin-allergi

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2 eller 0,5 tablett Bactrim forte x 2

Barn över 12 år: 2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Behandlingstid: 10 dagar

#### Preoperativ profylax vid perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG)

Engångsdos:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim eller 0,5 tablett Bactrim forte

Barn över 12 år: 2 tabletter Bactrim eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte

#### Luftvägsinfektion vid cystisk fibros

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2 eller 0,5 tablett Bactrim forte x 2

Barn över 12 år: 2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Behandlingstid: vanligen minst 10 dagar

#### Profylax i samband med urologisk rekonstruktiv kirurgi eller invasiv urologisk diagnostik

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2 eller 0,5 tablett Bactrim forte x 2

Barn över 12 år: 2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Behandlingstid: vanligen tills några dagar efter kateterdragning





## Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt

(ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### **Pneumocystis jiroveci pneumoni (PJP), behandling**

25 - 35 mg sulfametoxazol/5 - 7 mg trimetoprim/kg x 3

Detta motsvarar ungefär följande dosering:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 3

Barn över 12 år: 2 tabletter Eusaprim/Bactrim forte x 3

Behandlingstid: Efter terapivar bör nedtrappning av dos ske i samråd med infektionskonsult. Vanlig behandlingstid är 14 dagar.

#### **Pneumocystis jiroveci pneumoni (PJP), profylax**

Det finns olika doseringsstrategier för profylaxbehandling enligt följande:

##### A) Doseringschema med dosering x 2, DAGLIGEN:

Barn 6 - 12 år: 0,5 tablett Bactrim x 2

Barn över 12 år: 1 tablett Bactrim x 2 eller 0,5 tablett Bactrim forte x 2

##### B) Doseringschema med dosering x 2, TRE DAGAR per vecka

(i rad eller alternerande):

Barn 6 - 12 år: 0,5 tablett Bactrim x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

##### C) Doseringschema med dosering x 1, TRE DAGAR I RAD per vecka:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 1

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 1 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 1

##### D) Doseringschema med dosering x 2, TVÅ DAGAR i RAD per vecka:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2





## Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt

(ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter

### ÖVRIG INFORMATION

Behandling med sulfapreparat är kontraindicerat till barn under 6 veckor på grund av risk för displacement av bilirubin. Bör endast användas om andra alternativ saknas.

Stor försiktighet vid grav njurfunktionsnedsättning.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Trimetoprim-sulfametoxazol

<http://www.sls.se/raf/lakemedel/ovriga-preparat/>

Internetadress VGR, Alfresco - Percutan endoskopisk gastrostomi - FREKA PEG

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/10689?/a=false&guest=true>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2557](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2557)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-03-19

ePedID: 2557

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-03-26

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-03-26

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**