



## Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt

(ex Bactrim, Eusaprim/Bactrim forte) tabletter

**Högriskläkemedel - har två aktiva substanser.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Bactrim (400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim)  
Bactrim forte (800 mg sulfametoxazol + 160 mg trimetoprim)  
Eusaprim forte (160 mg trimetoprim + 800 mg sulfametoxazol)

Bactrim forte och Eusaprim forte är utbytbara med varandra.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

### ÖVRIG INFORMATION

Behandling med sulfapreparat är kontraindicerat till barn under 6 veckor på grund av risk för displacement av bilirubin. Bör endast användas om andra alternativ saknas. Stor försiktighet vid grav njurfunktionsnedsättning.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Bakteriell infektion med bakterier känsliga för sulfametoxazol och trimetoprim

Barn 6 - 12 år:  
1 tablett Bactrim x 2 eller  
0,5 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Barn över 12 år:  
2 tabletter Bactrim x 2 eller  
1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Detta motsvarar en ungefärlig dos på 30 mg sulfametoxazol och 6 mg trimetoprim per kg kroppsvikt och dygn.

Maxdos: 3 tabletter Eusaprim/Bactrim forte per dag

Behandlingstid: vanligen 10 dagar

#### Pneumocystis jiroveci pneumoni (PJP), behandling

6,72 mg trimetoprim/33,6 mg sulfametoxazol/kg x 3

Detta motsvarar ungefär följande dosering:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 3  
Barn över 12 år: 2 tabletter Eusaprim/Bactrim forte x 3

Behandlingstid: vanligen 14 dagar (21 dagar vid HIV)

#### Pneumocystis jiroveci pneumoni (PJP), profylax

Det finns olika doseringsstrategier för profylaxbehandling enligt följande:

##### A) Doseringsschema med dosering x 2, DAGLIGEN:

Barn 6 - 12 år: 0,5 tablett Bactrim x 2  
Barn över 12 år:  
1 tablett Bactrim x 2 eller  
0,5 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

##### B) Doseringsschema med dosering x 2, TRE DAGAR per vecka (i rad eller alternerande):

Barn 6 - 12 år: 0,5 tablett Bactrim x 2  
Barn över 12 år:  
2 tabletter Bactrim x 2 eller  
1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

## Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt

(ex Bactrim, Eusaprim/Bactrim forte) tabletter



### VANLIG INDIKATION OCH DOS

C) Doseringsschema med dosering x 1, TRE DAGAR I RAD per vecka:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 1

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 1 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 1

D) Doseringsschema med dosering x 2, TVÅ DAGAR i RAD per vecka:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

### Luftvägsinfektion vid Cystisk fibros

Barn 6 - 12 år:

1 tablett Bactrim x 2 eller

0,5 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Behandlingstid: vanligen minst 10 dagar

### Profylax i samband med urologisk rekonstruktiv kirurgi eller invasiv urologisk diagnostik

Barn 6 - 12 år:

1 tablett Bactrim x 2 eller

0,5 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

### Kattbett, vid penicillin-allergi

Barn 6 - 12 år:

1 tablett Bactrim x 2 eller

0,5 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

## Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt

(ex Bactrim, Eusaprim/Bactrim forte) tabletter



### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingstid: 10 dagar

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Trimetoprim-sulfametoxazol

<http://www.sls.se/raf/lakemedel/ovriga-preparat/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2557](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2557)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-03-07

ePedID: 2557

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-03-07

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-03-07

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**