



Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt

(ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter

Högriskläkemedel - har två aktiva substanser.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Bactrim 400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim
Bactrim forte 800 mg sulfametoxazol + 160 mg trimetoprim
Eusaprim forte 160 mg trimetoprim + 800 mg sulfametoxazol

Bactrim forte och Eusaprim forte är utbytbara med varandra.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:
Bactrim och Bactrim forte kan delas för att få två lika stora doser. Eusaprim forte ska endast delas för att underlätta nedsväljning.

ÖVRIG INFORMATION

Behandling med sulfapreparat är kontraindicerat till barn under 6 veckor på grund av risk för displacement av bilirubin. Bör endast användas om andra alternativ saknas.
Stor försiktighet vid grav njurfunktionsnedsättning.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Bactrim (registrerad produkt)

1 st, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackning. Gäller även Bactrim forte.

Eusaprim Forte (registrerad produkt)

1 st, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för sulfametoxazol och trimetoprim

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2 eller 0,5 tablett Bactrim forte x 2
Barn över 12 år: 2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Denna dosering motsvarar en ungefärlig mängd av
30 mg sulfametoxazol/kg/dag och 6 mg trimetoprim/kg/dag.

Maxdos: 3 tabletter Eusaprim/Bactrim forte per dag

Behandlingstid: vanligen 10 dagar

Kattbett, vid penicillin-allergi

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2 eller 0,5 tablett Bactrim forte x 2
Barn över 12 år: 2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Behandlingstid: 10 dagar

Preoperativ profylax vid perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG)

Engångsdos:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim eller 0,5 tablett Bactrim forte
Barn över 12 år: 2 tabletter Bactrim eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte

Luftvägsinfektion vid cystisk fibros

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2 eller 0,5 tablett Bactrim forte x 2
Barn över 12 år: 2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Behandlingstid: vanligen minst 10 dagar

Profylax i samband med urologisk rekonstruktiv kirurgi eller invasiv urologisk diagnostik

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2 eller 0,5 tablett Bactrim forte x 2
Barn över 12 år: 2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Behandlingstid: vanligen tills några dagar efter kateterdragning





Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt

(ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Pneumocystis jiroveci pneumoni (PJP), behandling

6,72 mg trimetoprim/33,6 mg sulfametoxazol/kg x 3

Detta motsvarar ungefär följande dosering:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 3

Barn över 12 år: 2 tabletter Eusaprim/Bactrim forte x 3

Behandlingstid: Efter terapivar bör nedtrappning av dos ske i samråd med infektionskonsult. Vanlig behandlingstid är 14 dagar.

Pneumocystis jiroveci pneumoni (PJP), profylax

Det finns olika doseringsstrategier för profylaxbehandling enligt följande:

A) Doseringsschema med dosering x 2, DAGLIGEN:

Barn 6 - 12 år: 0,5 tablett Bactrim x 2

Barn över 12 år: 1 tablett Bactrim x 2 eller 0,5 tablett Bactrim forte x 2

B) Doseringsschema med dosering x 2, TRE DAGAR per vecka

(i rad eller alternerande):

Barn 6 - 12 år: 0,5 tablett Bactrim x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

C) Doseringsschema med dosering x 1, TRE DAGAR I RAD per vecka:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 1

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 1 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 1

D) Doseringsschema med dosering x 2, TVÅ DAGAR i RAD per vecka:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2





Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt

(ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Trimetoprim-sulfametoxazol

<http://www.sls.se/raf/lakemedel/ovriga-preparat/>

Internetadress VGR, Alfresco - Percutan endoskopisk gastrostomi - FREKA PEG

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2557

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-10-29

ePedID: 2557

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-10-31

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-10-31

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT