

## cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension

---

<b>Instruktionen gäller för:</b>	Alt. 1: Färdigspädd oral suspension Isocef 36 mg/mL. Alt. 2: Pulver till oral suspension Isocef 36 mg/mL som späds på vårdenheten.  OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.
<b>Beredningsinstruktion:</b>	Alt. 2: Vänd flaskan några gånger innan vattnet tillsätts för att lösgöra granulatet. Fyll den medföljande plastbägaren med sterilt vatten upp till märket "livello acqua" (vattennivå). Tillsätt vattnet till flaskan uppdelat i 2 jämnstora omgångar. Vänd flaskan upp och ner och skaka den kraftigt efter varje tillsats så att granulatet löser sig fullständigt.  15 gram granulat som löses upp i den angivna mängden vatten (upp till märket) bildar 60 mL suspension som innehåller 36 mg/mL av ceftibuten.

---

<b>Arbetsmiljö</b>	Allergirisk, hantera enligt lokal instruktion, Cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner
--------------------	---

---

<b>Administreringsätt</b>	Ska tas 1 - 2 timmar före eller efter måltid. Skaka flaskan innan varje administrering. Oralt Enteralt i sond
---------------------------	---

---

### Vanlig indikation och dos

#### Urinvägsinfektion, vid misstänkt njurengagemang eller oklar nivå

Barn 0 - 18 år: 9 mg/kg x 1, max 400 mg

Behandlingstid:

Barn under 2 år: 10 dagar

Barn över 2 år, utan njurengagemang: 5 dagar

Barn över 2 år, med njurengagemang: 10 dagar

#### Antibiotikaprofylax vid MUC (andrahandsval)

Barn 0 - 18 år: engångsdos 9 mg/kg, max 400 mg.

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-12-05 09:40:37  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 11:44:02  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2561  
ID/spårnummer: 4005  
Giltig fr o m: 2017-12-05 11:44:02  
Utskriftsdatum: 2017-12-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# ceFTIBUten oralt 36 mg/mL

## (Isocef licens) oral suspension

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
9 mg/kg max 400 mg	0,25 mL	1,25 mL	2,5 mL	11,1 mL

**Hållbarhet preparat:**

Isocef (licensprodukt)

 36 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Färdigberedd suspension förvaras i rumstemperatur och är hållbar 14 dagar.

**Övrig information**

Ceftibuten finns även som kapslar 400 mg.

**Referens/Länk**

Internetadress RAF, Ceftibuten

<http://www.sls.se/raf/lakemedel/cefalosporiner/>

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Svensk Barnnefrologisk Förening, UVI-riktlinjer

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)**Lokal länk**

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjonet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2561](http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2561)**Substansspecifika uppgifter**

Ceftibuten, J01DD14

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POFMUB3R3VVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-12-05 09:40:37  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 11:44:02  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2561  
ID/spårnummer: 4005  
Giltig fr o m: 2017-12-05 11:44:02  
Utskriftsdatum: 2017-12-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

