

## Valproat rektalt 300 mg (Delepsine)

Kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år.

Till följd av suppositoriets styrka är Delepsine endast lämpligt att ge till barn från ca 15 kg (från ca 3 år) och då främst vid stabil underhållsbehandling. Suppositorierna ska inte delas eftersom jämn fördelning av läkemedlet inte kan garanteras. Detta försvårar dosjusteringar.

---

**Arbetsmiljö** Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

---

**Administreringsätt**

Rektalt

---

**Vanlig indikation och dos**

**Epilepsi**

Barn ca 3 år (ca 15 kg) - 11 år:

Initial behandling: 10 - 15 mg/kg x 1 eller 5 - 7,5 mg/kg x 2, max 600 mg per dos.

Öka i steg om 75 - 150 mg/dygn var 3:e dag till anfallsfrihet.

Överväg annan beredningsform eftersom suppositoriet inte ska delas.

Underhållsdos: 10 - 20 mg/kg x 2

Ungdomar 12 - 18 år:

Initialt behandling: 600 mg x 1 eller 300 mg x 2

Öka i steg om 150 - 300 mg var 3:e dag

Underhållsdos 500 - 1000 mg x 2, max 2,5 g dagligen

**Infantil spasm**

Dos upp till 30 mg/kg x 2 har använts.

---

**Hållbarhet preparat:**

Delepsine (Licensprodukt)

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-23 14:41:52  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:36:31  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2566  
ID/spårnummer: 1549  
Giltig fr o m: 2016-09-28 10:36:31  
Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Valproat rektalt 300 mg (Delepsine)

- 300 mg, Suppositorium
- Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8° C).

---

## Övrig information

Delepsine suppositorier är ett licenspreparat.

Valproat kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år. Kontroll av leverfunktionen ska göras före behandlingsstart samt under de 6 första behandlingsmånaderna.

Behandling med valproat ger hög risk för missbildningar och/eller utvecklingsstörning hos foster. Därför ska flickor i fertil ålder endast behandlas med valproat om andra behandlingsalternativ saknas.

Valproat interagerar med ett flertal läkemedel, bl.a. med andra läkemedel mot epilepsi. Effekten kan bli ökad eller minskad plasmakoncentration av andra läkemedel, men även ökad eller minskad koncentration av valproat. Se FASS för mer information.

Om dygnsdosen överstiger 40 mg/kg - kontrollera klin kemiska och hematologiska parametrar.

---

## Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2016-06-02

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

Internetadress Hemsida från Dansk Laegemiddel Information A/S, Hämtat: 2016-04-07

<http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1899>

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsbehandling av epilepsi 2011, Hämtat: 2016-09-23

[http://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/2011\\_02\\_02\\_Rek%20Epilepsi-webb\\_bokm%c3%a4rken.pdf](http://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/2011_02_02_Rek%20Epilepsi-webb_bokm%c3%a4rken.pdf)

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Handläggningsstöd barnepilepsi, Hämtat: 2016-09-23

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/sextonepilepsi.pdf>

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2016-09-20

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show-grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade)

---

## Substansspecifika uppgifter

Valproic acid, N03AG01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POC1U973RVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-09-23 14:41:52  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:36:31  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2566  
ID/spårnummer: 1549  
Giltig fr o m: 2016-09-28 10:36:31  
Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

