



Levobupivakain inf/inj 1,25 mg/mL

(fd Chirocaine, licens) flera administreringsätt

Får INTE ges intravenöst (intravasalt).

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Levobupivakain infusionsvätska 1,25 mg/mL

(ex Levobupivacaine Fresenius Kabi, licens)

Alt. 2 - 3: Spädning från Levobupivakain infusionsvätska/koncentrat 2,5 mg/mL

(ex Levobupivacaine Fresenius Kabi, licens)

Alt. 4: Spädning från Levobupivakain infusionsvätska/koncentrat 5 mg/mL

(ex Levobupivacaine Fresenius Kabi, licens)

INGEN SPÄDNING

Alt. 1

INF/INJ
1,25 mg/mL
 flera volymer finns

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Levobupivakain		NaCl 9 mg/mL		INF/INJ
2,5 mg/mL	+		=	1,25 mg/mL
10 mL		10 mL		20 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 3

Levobupivakain		NaCl 9 mg/mL		INF/INJ
2,5 mg/mL	+		=	1,25 mg/mL
50 mL		50 mL		100 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 4

Levobupivakain		NaCl 9 mg/mL		INF/INJ
5 mg/mL	+		=	1,25 mg/mL
25 mL		75 mL		100 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska endast ordineras av läkare med god kännedom om komplikationsrisker, övervakning och säkerhetsåtgärder.

Dosen är beroende av vilken nerv eller vilket område som ska bedövas. Följ lokal rutin för vanlig dos.

Nedan anges endast MAXDOSER utifrån risk för systemisk toxicitet.

Postoperativ smärtlindring

MAXDOS kontinuerlig infusion:

Nyfödda (prematura och fullgångna nyfödda):
 0,25 mg/kg/tim (0,2 mL/kg/tim)

Barn 1 mån - 18 år:
 0,5 mg/kg/tim (0,4 mL/kg/tim),
 dock max 150 mg inom 4 timmar, maximal DYGNSDOS 400 mg.

Akut smärta

MAXDOS engångsdos:

Barn 1 mån - 18 år:
 2 mg/kg (1,6 mL/kg)

Max 150 mg inom 4 timmar, maximal DYGNSDOS 400 mg.

ÖVRIG INFORMATION

Levobupivakain har (liksom ropivakain) längre effektduration och något längre anslagstid än många andra lokalanestesimedel. Vid behov av mer snabbverkande/kortverkande lokalanestesimedel är lidokain att föredra.





Levobupivakain inf/inj 1,25 mg/mL

(fd Chirocaine, licens) flera administreringsätt

ADMINISTRERING

Perifer nervblockad: engångsdos eller kontinuerlig infusion via blockadkateter

Epiduralt: engångsdos eller kontinuerlig infusion via en EDA

Lokalinfiltration: kontinuerlig infusion via sårkateter

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Levobupivakain (licensprodukt)

5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Bruten förpackning: Får ej sparas, används direkt.

2,5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Bruten förpackning: får ej sparas, används direkt.

1,25 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Bruten förpackning: får ej sparas, används direkt.

Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Lokalt arbetssätt kan medge längre hållbarhetstid, följ lokal rutin.

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2570

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 2570

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-01-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT