

Dalacin 15 mg/ml oral lösning

Ingen spädninginstruktion

Spädning sker på apoteket. Beställs färdigspädd.

Hållbarhet och beredningsform

Dalacin (Registrerad Produkt)

- 15 mg/mL, Granulat till oral lösning, Hållbar: Beredda lösningen är hållbar i 2 veckor

Administreringsätt

Oralt: Mat förlänger absorptionen av klindamycin, men påverkar ej plasmakoncentrationen.

Enteralt i sond: Går att ges i sond.

Vanlig indikation

Neonatal infektion med behov av klindamycin

Vanlig dosering

5 mg/kg x 3.

Barn över 2 veckor kan behöva dosering x 4.

Rimlig dos för barn

5 mg/kg

1 kg

0,3 mL

5 kg

1,7 mL

10 kg

50 kg

Substans

Clindamycin, J01FF01

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner, -

Referens/Länk

Neonatal Formulary

Rekommendation Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. <http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/Nyheter-2013/Updaterad-broschyr-om-behandling-av-vanliga-infektioner/>
(NULL)

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-11-12 10:21:53

Fastställare/läkare: Lars Naver 2013-11-15 07:09:33

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2573

ID/spårnummer: 171

Giltig fr o m: 2013-11-15 07:09:33

Utskriftsdatum: 2013-11-15

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

