

Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

Instruktionen gäller för: Färdigberedd oral lösning Dalacin 15 mg/mL

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringsätt

Oralt
Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Systemisk bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 5 mg/kg x 3

Dag 8 - 28:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 5 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 1800 mg/dygn

Vid allvarliga infektioner bör dosering x 4 övervägas.

Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 0 - 18 år: 5 mg/kg x 3 i 10 dagar, max 300 mg/dos

Behandlingstid: 10 dagar

Endokarditprofylax, vid penicillinallergi

Barn 0 - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 minuter före ingrepp: 15 mg/kg, max 600 mg

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-24 14:33:58

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-25 13:06:14

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2573

ID/spårnummer: 3601

Giltig fr o m: 2017-08-25 13:06:14

Utskriftsdatum: 2017-08-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

Impetigo, sårinfektioner, erysipelas; vid penicillinallergi

Barn 0 - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 300 mg/dos

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling vid skelettinfectioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av Kingella kingae eller Haemophilus influenzae. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 0 - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling, i okomplicerade fall: 4 veckor

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	0,33 mL	1,67 mL	3,33 mL	16,7 mL
15 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	
max 600 mg				40 mL

Hållbarhet preparat:

Clindamycin/Dalacin (registrerad produkt)

- 15 mg/mL, Granulat till oral lösning

Hållbar: Den beredda lösningen är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2017/infektioner/>

Internetadress Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om Neonatal Sepsis

<https://lv.se/neonatal-sepsis>

NeoFax

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-08-24 14:33:58
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-25 13:06:14
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 2573
ID/spårnummer: 3601
Giltig fr o m: 2017-08-25 13:06:14
Utskriftsdatum: 2017-08-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaproylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecfab19/antibiotikaproylax.pdf>

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2573

Substansspecifika uppgifter

Clindamycin, J01FF01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancetid=IDE4POEMUACAQVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-24 14:33:58
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-25 13:06:14
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2573
ID/spårnummer: 3601
Giltig fr o m: 2017-08-25 13:06:14
Utskriftsdatum: 2017-08-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

