



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd oral lösning Dalacin 15 mg/mL

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klindamycin (registrerad produkt)

15 mg/mL, Granulat till oral lösning

HÅLLBAR: Färdigberedd lösning är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Systemisk bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 5 mg/kg x 3

Dag 8 - 28:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 5 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 1800 mg/dygn

Vid allvarliga infektioner bör dosering x 4 övervägas.

Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3 i 10 dagar, max 300 mg/dos

Behandlingstid: 10 dagar

Endokarditprofylax, vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 minuter före ingrepp: 15 mg/kg, max 600 mg

Impetigo, sårinfektioner, erysipelas; vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 300 mg/dos

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling vid skelettinfectioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av *Kingella kingae* eller *Haemophilus influenzae*. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling, i okomplicerade fall: 4 veckor



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

RIMLIG DOS FÖR 15 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	0,33 mL	1,67 mL	3,33 mL	16,67 mL
15 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	-
max 600 mg	-	-	-	40 mL

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2017/Infektioner/>

Internetadress Läkemiddelsverkets behandlingsrekommendation om Neonatal Sepsis

<https://lv.se/neonatal-sepsis>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturoversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecefab19/antibiotikaprofylax.pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2573

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-04-20

ePedID: 2573

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-20

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

ePedID: 2573.3 Giltig fr o m: 2018-04-20

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_2573.html