



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigberedd oral lösning Dalacin 15 mg/mL

Alt. 2: Granulat till oral lösning 15 mg/mL som iordningställs på vårdenheten, se nedan.

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver/granulat ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2

| | | | | |
|-------------|---|----------------|---|-----------|
| Klindamycin | | Sterilt Vatten | | ORAL LÖSN |
| 15 mg/mL | | | | 15 mg/mL |
| 1 st | + | 60 mL | = | 80 mL |

Beredningsinstruktion:

Vänd flaskan några gånger innan vattnet tillsätts för att lösgöra granulatet.

Granulatet bidrar med volym vilket gör att slutvolymen blir 80 mL.

ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klindamycin (registrerad produkt)

15 mg/mL, Granulat till oral lösning

HÅLLBAR: Flaskan med granulat förvaras i rumstemperatur. Färdigberedd lösning är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur.

15 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Färdigberedd lösning är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 5 mg/kg x 3

Dag 8 - 28:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 5 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3 - 4, max 1800 mg/dygn

Vid allvarliga infektioner bör intravenös behandling övervägas.

Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Behandlingstid: 10 dagar

Endokarditprofylax, vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 minuter före ingrepp: 15 mg/kg, max 600 mg

Impetigo, sårinfektioner, erysipelas, stjärtfluss, preseptal cellulit; vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling vid skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av Kingella kingae eller Haemophilus influenzae. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

RIMLIG DOS FÖR 15 mg/mL

| | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|------------|---------|---------|---------|----------|
| 5 mg/kg | 0,33 mL | 1,67 mL | 3,33 mL | 16,67 mL |
| 15 mg/kg | 1 mL | 5 mL | 10 mL | - |
| max 600 mg | - | - | - | 40 mL |

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2018/Infektioner/>

Internetadress Läkemedelsverket - Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

<https://lv.se/neonatal-sepsis>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecefab19/antibiotikaprofylax.pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2573

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-09-04

ePedID: 2573

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-04

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

ePedID: 2573.4 Giltig fr o m: 2018-09-04

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_2573.html