



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(ex Dalacin) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Färdigspädd oral lösning 15 mg/mL (Dalacin)
Alt. 2: Granulat till oral lösning Dalacin 15 mg/mL, späds på vårdenhet

Vid restsituation kan licensprodukterna Sobelin Granulat eller Clindamycin Pfizer 75 mg/5 mL (= 15 mg/mL) användas.

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver/granulat ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.

INGEN SPÄDNING

Alt. 1 Färdigspädd från apotek

ORAL LÖSN
15 mg/mL
80 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Klindamycin		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
15 mg/mL				15 mg/mL
	+		=	
1 flaska		60 mL		80 mL

Beredningsinstruktion:

Vänd flaskan några gånger innan vattnet tillsätts för att lösgöra granulatet. Granulatet bidrar med volym vilket gör att slutvolymen blir 80 mL.

För licensprodukterna anges att vattnet ska tillsättas i två omgångar (2 x 30 mL) och att flaskan ska skakas mellan tillsättningarna.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

ADMINISTRERING

Oralt
Enteralt

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Nyfödda
Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Postnatal ålder 0 - 7 dagar:
Oavsett gestationsålder vid födsel: 5 mg/kg x 3

Postnatal ålder 8 - 28 dagar:
Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 5 mg/kg x 3
Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3 - 4, max 1,8 gram/DYGN

Vid allvarliga infektioner bör intravenös behandling övervägas.

Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/DYGN

Behandlingstid: 10 dagar

Endokarditprofylax, vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:
Engångsdos 30 - 60 min före ingrepp: 15 mg/kg, max 600 mg

Impetigo, sårinfektioner, erysipelas, stjärtfluss, preseptal cellulit; vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/DYGN

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling vid skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av Kingella kingae eller Haemophilus influenzae. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 900 mg/DYGN

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor





Klindamycin oralt 15 mg/mL

(ex Dalacin) oral lösning

RIMLIG DOS för Klindamycin oralt 15 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	0,33 mL	1,67 mL	3,33 mL	16,67 mL
15 mg/kg, max 600 mg	-	5 mL	10 mL	40 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klindamycin (registrerad produkt)

15 mg/mL, Granulat till oral lösning

Förvaras i rumstemperatur.

15 mg/mL, Oral lösning

Färdigspädd lösning är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur. Gäller även licensprodukter.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

www.lakemedelsverket.se/neonatal-sepsis

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaproylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecefab19/antibiotikaproylax.pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2573

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2573

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-05-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT