



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(ex Dalacin) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigspädd oral lösning 15 mg/mL (Dalacin)

Alt. 2: Granulat till oral lösning Dalacin 15 mg/mL, späds på vårdenhet

Vid restsituation kan följande licensprodukterna användas:

Sobelin Granulat eller Clindamycin Pfizer 75 mg/5 mL (= 15 mg/mL)

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver/granulat ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.

INGEN SPÄDNING

Alt. 1 Färdigspädd från apotek

ORAL LÖSN
15 mg/mL
80 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Klindamycin		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
15 mg/mL	+		=	15 mg/mL
1 flaska		60 mL		80 mL

Beredningsinstruktion:

Vänd flaskan några gånger innan vattnet tillsätts för att lösgöra granulatet.

Granulatet bidrar med volym vilket gör att slutvolymen blir 80 mL.

För licensprodukterna anges att vattnet ska tillsättas i två omgångar (2 x 30 mL) och att flaskan ska skakas mellan tillsättningarna.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Postnatal ålder 0 - 7 dagar:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 5 mg/kg x 3

Postnatal ålder 8 - 28 dagar:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 5 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år

Normaldos: 5 - 8 mg/kg x 3, max 300 mg x 3

Högdos:

(allvarlig infektion samt vid mindre känsliga bakterier enl resistensbestämning)

7,5 - 10 mg/kg x 4, max 600 mg x 4

Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 300 mg x 3

Behandlingstid: 10 dagar

Endokarditprofylax, alternativ vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 min före ingrepp: (15 -) 20 mg/kg, max 600 mg

Impetigo, sårinfektioner, erysipelas, stjärtfluss, preseptal cellulit; alternativ vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 300 mg x 3

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling vid skeletinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av Kingella kingae eller Haemophilus influenzae. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 300 mg x 3

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor





Klindamycin oralt 15 mg/mL

(ex Dalacin) oral lösning

RIMLIG DOS för Klindamycin oralt 15 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	0,33 mL	1,67 mL	3,33 mL	16,67 mL
7,5 mg/kg	-	2,5 mL	5 mL	25 mL
15 mg/kg	-	5 mL	10 mL	-
max 300 mg/DOS	-	-	-	20 mL
max 600 mg/DOS	-	-	-	40 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klindamycin (registrerad produkt)

15 mg/mL, Granulat till oral lösning

Förvaras i rumstemperatur.

15 mg/mL, Oral lösning

Färdigspädd lösning är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur. Gäller även licensprodukter.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompedium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompedium/>

Internetadress VGR, Alfresco - Endokarditprofylax på barn

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su9805-1593997-2518/surrogate/Endokarditprofylax%20p%c3%a5%20barn.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Antibiotikaprofylax i tandvården

www.lakemedelsverket.se/profylax-tandvard

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

www.lakemedelsverket.se/neonatal-sepsis

NeoFax

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecfab19/antibiotikaprofylax.pdf>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk barninfektionsförening - Led- och skelettinfectioner hos barn

<https://inf.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2573



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(ex Dalacin) oral lösning



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2573

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-05-22

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT