



Dalteparin subkutan inj

förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta

Detta är ett högriskpreparat då stor förväxlingsrisk finns.

När du hanterar detta läkemedel måste du veta skillnaden mellan:

INJEKTIONSFLASKOR som anger styrkan i E/mL

FÖRFYLLEDA SPRUTOR som anger dosen i E/spruta

Använd produkt utan konserveringsmedel till nyfödda och spädbarn.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Förfyllda sprutor (utan konserveringsmedel):

2 500 E/spruta (0,2 mL)

5 000 E/spruta (0,2 mL)

7 500 E/spruta (0,3 mL)

10 000 E/spruta (0,4 mL)

12 500 E/spruta (0,5 mL)

15 000 E/spruta (0,6 mL)

Instruktionen gäller INTE för injektionsflaskor.

ADMINISTRERING

Subkutan injektion

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordinationen bör anges i antal enheter (E).

Ordineras i samråd med koagulationsspecialist.

Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <30 mL/min) reducera dosen med 30 % och monitorera anti-faktor-Xa aktivitet.

Försiktighet vid trombocytopeni.

Undvik användning tillsammans med epidural/spinal anestesi då det finns risk för allvarliga komplikationer.

Trombosbehandling (exempel djup ventrombos, lungemboli)

Nyfödda: 125 - 150 E/kg x 2

Barn 1 mån - 11 år: 100 E/kg x 2

Barn 12 - 18 år: 200 E/kg x 1, fördela på 100 E/kg x 2 om ökad risk för blödning

Exempel på lämplig spruta beroende på dos och patientens vikt.

Spruta	100 E/kg	200 E/kg
2 500 E/spruta	25 kg	12,5 kg
5 000 E/spruta	50 kg	25 kg
7 500 E/spruta	75 kg	37,5 kg
10 000 E/spruta	100 kg	50 kg
12 500 E/spruta	125 kg	62,5 kg
15 000 E/spruta	150 kg	75 kg





Dalteparin subkutan inj

förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fragmin (registrerad produkt)

2500 E, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

5000 E, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

7500 E, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

10000 E, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

12500 E, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

15000 E, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Trombosprofylax

Nyfödda: 60 - 100 E/kg x 1

Barn 1 mån - 11 år: 60 - 100 E/kg x 1

Barn 12 - 18 år: 2 000 - 5 000 E x 1

Exempel på lämplig spruta beroende på dos och patientens vikt.

Spruta	60 E/kg	100 E/kg
2 500 E/spruta	42 kg	25 kg
5 000 E/spruta	83 kg	50 kg





Dalteparin subkutan inj

förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta

ÖVRIG INFORMATION

Barn yngre än 2 - 3 månader alt. under 5 kg har ökat behov av dalteparin per kroppsvikt (oklart om detta är pga annorlunda farmakokinetik eller -dynamik).

MONITORERING:

Mätning av anti-faktor-Xa nivåer ca 3 - 4 timmar efter dosering rekommenderas (start 3 - 4 timmar efter 2 - 3:e dosen när steady-state uppnåtts).

Terapeutiskt intervall 0,5 - 1,0 E/mL.

- Om anti-Xa under 0,35 – höj dosen med 25 %
- Om anti-Xa 0,35 - 0,49 – höj dosen med 15 %
- Om anti-Xa över 1,0 – sänk dosen med 20 - 30 %
- Nytt prov efter 1 - 2 dygn (3 - 4 timmar efter dos)

När terapeutiskt intervall uppnåtts behövs normalt inte ytterligare provtagningar.

Njursjuka eller svårt sjuka barn behöver dock ytterligare provtagningar, t.ex 1 gång per vecka på inlagda barn.

Om oväntat svårt att nå målvärde, kontrollera antitrombinnivå.

Små barn som ökar snabbt i vikt behöver också provtas och dosjusteras efter utskrivning.

Vid övergång från heparin till dalteparin:

Om APTT över 100 ge fulldos dalteparin 1 - 2 timmar efter avslutad heparininfusion.

Om APTT under 100 ge fulldos dalteparin direkt.

PATIENTSÄKERHET:

Ha ett begränsat sortiment av dalteparin på avdelningen. Viktigt att ordinationen överensstämmer med det aktuella sortimentet.

Fragmin som är konserverad innehåller bensylalkohol som inte ska användas av nyfödda och spädbarn (detta är en annan tolkning än FASS där det inte är rekommenderat till barn under 3 år, vilket ger en väl tilltagen säkerhetsmarginal). Förfyllda sprutor är inte konserverade.

Många olika styrkor finns, risk för tio-potensfel. Ifrågasättande av dalteparindoser ska alltid respekteras och kontrolleras noggrant.





Dalteparin subkutan inj

förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Västra Götalandsregionen, Tromboser hos barn

<https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/32841?/a=false&guest=true>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Klaassen ILM et al., Are low-molecular-weight heparins safe and effective in children? A systematic review, Blood Rev, 2019, 33, 33-42

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30041977>

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2021-10-29

ePedID: 2584

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-11-02

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-11-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT