

Esomeprazol (ex Nexium) IV inj/jejunostomi 8 mg/mL

En-stegspädning till 8 mg/mL 5 mL

Esomeprazol		NaCl 9 mg/mL		INJ-INF LÖ
40 mg	+		=	8 mg/mL
1 st		5 mL		5 mL

Beredningsinstruktion

Lösningen för injektion iordningställs genom att tillsätta 5 mL 0,9% natriumkloridlösning för intravenöst bruk till injektionsflaskan med frystorkad esomeprazol.

Den färdigberedda lösningen för injektion är klar och färglös till svagt ljusgul.

Hållbarhet och beredningsform

Esomeprazol (Registrerad Produkt)

- 8 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning, Hållbar: 24 tim kyl, 12 tim rumstemp
- 40 mg, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning, Hållbar: Se förpackningen. Ljuskänsligt.

Administreringsätt

Barn: Intravenös injektion under ca 3 minuter.

Bör ges på fastande mage, på morgonen alt. efter 4 timmars fasta och minst 30 minuter före maten.

För administrering i jejunostomi, OBS! kontrollera pH innan administrering, måste vara neutralt pH.

Bör ges på fastande mage, på morgonen alt. efter 4 timmars fasta och minst 30 minuter före maten.

Vanlig indikation

Gastroesofagal refluxsjukdom (GERD)

Vanlig dosering

Neo+Barn: 1 mg/kg x 1

Dosen kan ökas till max 3 mg/kg eller 80 mg.

Vid doser över 2,5 mg/kg kan dygnsdosen delas på två doseringstillfällen.

Övrig information

Denna spädningsinstruktion gäller för både Esomeprazol SUN och Nexium pulver till injektion/infusion.

Substans

Esomeprazol, A02BC05

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner, Esomeprazolnatrium kan ge allergi vid hudkontakt. Damm kan verka irriterande på luftvägarna. Långvarig eller upprepade inandning eller hudkontakt kan ge allergiska

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2014-03-12 11:48:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2014-03-12 11:49:42

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2634

ID/spårnummer: 252

Giltig fr o m: 2014-03-12 11:49:42

Utskriftsdatum: 2014-03-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Esomeprazol (ex Nexium) IV inj/jejunostomi 8 mg/mL

reaktioner.

Referens/Länk

FASS Esomeprazol SUN, Hämtat: 2014-02-27

<http://www.fass.se/LIF/product?8&userType=2&nplId=20100930000096&docType=3>

Internetadress Vårdprogram GERD (Barnläkarföreningen), Hämtat: 2014-02-19

http://www.blf.net/gastro/varldprogram/VP%20GERD%20BLF%202013_ver2_korr.pdf

Rekommendation (Grade 1C), Hämtat: 2013-11-12

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

FASS Nexium, Hämtat: 2014-02-27

<http://www.fass.se/LIF/product?11&userType=2&nplId=20030822000043&docType=3>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2014-03-12 11:48:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2014-03-12 11:49:42

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2634

ID/spårnummer: 252

Giltig fr o m: 2014-03-12 11:49:42

Utskriftsdatum: 2014-03-12

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

