

Acetylsalicylsyra (ex Trombyl) PO, tabl

Acetylsalicylic acid

Administreringsätt

Oralt

Vanlig indikation och dos

Trombosprofylax efter levertransplantation

Barn under 10 kg: 37,5 mg varannan dag (= 0,5 tablett Trombyl varannan dag)

Barn 10 - 30 kg: 37,5 mg x 1 (= 0,5 tablett Trombyl dagligen)

Barn över 30 kg: 75 mg x 1 (= 1 tablett Trombyl dagligen)

Behandling ska pågå 12 månader efter levertransplantation.

Övrig information

Påbörja behandling med acetylsalicylsyra när heparininfusion avslutas.

Detta blad gäller för acetylsalicylinnehållande tablett, Trombyl 75 mg eller apotekstillverkade.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2015-06-16

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2015-06-16

http://online.lexi.com/crisql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2015-06-16

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-08-24 08:42:20

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-08-24 15:33:36

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2656

ID/spårnummer: 788

Giltig fr o m: 2015-08-24 15:33:36

Utskriftsdatum: 2015-08-24

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

