

Ketanest IV inf Individuell spädning, 1 mL = 100 mikrogram/kg

S-ketamine

Individuell spädning

Beredningsinstruktion

Tillsätt 10 mg Ketanest (= 0,4 mL Ketanest 25 mg/mL) per kg kroppsvikt till NaCl 0,9 % så att slutvolymen blir 100 mL. Detta ger då en lösning med koncentrationen 100 mikrogram/kg/mL.

Exempel: Volym av Ketanest 25 mg/mL som ger önskad styrka vid spädning

Kroppsvikt	Volym vid styrka 0,1 mg/kg/mL
------------	-------------------------------

1 kg	0,4 mL upp till 100 mL
5 kg	2 mL upp till 100 mL
10 kg	4 mL upp till 100 mL

Administreringsätt

Intravenös kontinuerlig infusion (24 tim)

Vanlig indikation och dos

Kontinuerlig infusion mot smärta för barn upp till 10 kg.

1 ml = 100 mikrogram/kg

Infundera 0 - 2 mL/tim.

Övrig information

Denna spädning används för barn upp till 10 kg, för barn över 10 kg använd fast spädning till 1 mg/mL.

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-09-15

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation (Grade 2B), Hämtat: 2015-09-15

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

FASS Ketanest injektionsvätska 25 mg/ml, Hämtat: 2014-02-26

<http://www.fass.se/LIF/product?21&userType=2&nplid=20130105000071>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-09-14 13:56:15

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-09-23 10:26:38

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2658

ID/spårnummer: 867

Giltig fr o m: 2015-09-23 10:26:38

Utskriftsdatum: 2015-09-23

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

