

Klonidin oralt 75 mikrog

(Catapresan Licens)

Administreringsätt

Oralt: Premedicineringsdos ges 40 - 60 minuter före planerad procedur.
Maximal analgetisk effekt efter 60 - 90 minuter.

Vanlig indikation och dos

Smärta, oro, opiatabstinens

Barn: 1 - 3 mikrogram/kg/dos x 3

Premedicinering inför procedur (alla åldrar)

2 mikrogram/kg, max 150 mikrogram/dos

Övrig information

Klonidin kan vara kontraindicerat hos barn med hjärtsjukdom, arrytmier och liknande besvär.

Klonidin ska ges med försiktighet vid hypovolemi eller hypotension då effekten kan bli ytterligare sänkt blodtryck med kliniska symtom.

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Seding och analgesi vid ingrepp och undersökningar, Hämtat: 2015-11-06

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDE680B4D011CD1068C1257A310040C5F5?>

Rekommendation ,(Grade 2A), Hämtat: 2015-11-06

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

Substansspecifika uppgifter

Clonidine hydrochloride, C02AC01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCVU9U50VERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-10-20 11:22:42

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-11-06 10:44:02

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2692

Versionsnummer: 1.0

Giltig fr o m: 2015-11-06 10:44:02

Utskriftsdatum: 2015-11-06

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

