



Klonidin oralt

(ex Catapresan licens) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Licensläkemedel tabletter 75, 100 och 150 mikrog (ex Catapresan)
Licensläkemedel depottabletter 0,1 och 0,2 mg (Kapvay)

Till små barn och vid administrering via sond rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond: Oral lösning rekommenderas, se annan instruktion.

Premedicineringsdos ges 40 - 60 min före planerad procedur.
Maximal analgetisk effekt efter 60 - 90 minuter.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klonidin (ex Catapresan) (licensprodukt)

75 mikrog, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkorna 100 och 150 mikrog.

100 mikrog, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkan 200 mikrog.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Denna instruktion lämpar sig för barn som kan svälja tabletter och väger över 25 kg.

Smärta

Nyfödda: För dosering, se annan instruktion
Barn 1 mån - 18 år: 1 - 3 mikrog/kg x 2 - 3 (- 6)

Premedicinering inför procedur

Nyfödda: För dosering, se annan instruktion
Barn 1 mån - 18 år: 2 - 3 (- 4) mikrog/kg, max 150 mikrog/DOS

Vid otillräcklig effekt ges ytterligare 1,5 mikrog/kg, kan upprepas.

Ges med fördel tillsammans med mat.

Oro, opiatabstinens

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 3 mikrog/kg x 3

Hypertoni

Barn 1 - 11 år: Startdos 1 - 2 mikrog/kg x 2 - 4, max 25 mikrog/kg/DYGN
Barn från 12 år (fast dosering): Startdos 100 mikrog/DOS x 2
Vid behov, öka dosen stegvis, max 2,4 mg/DYGN

Sömnstörning vid ADHD (begränsad evidens)

Barn från 6 år och 45 kg (tablett och depottablett): Startdos 100 mikrog/DOS x 1
Dygnsdosen kan ökas var 7:e dag
Måldos 150 mikrog/DOS, max 400 mikrog/DYGN
Dygnsdosen kan fördelas på två doseringstillfällen.





Klonidin oralt

(ex Catapresan licens) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

Antidot: Symtomgivande bradykardi kan behandlas med atropin.

Klonidin är kontraindicerat vid hypotension och svår bradyarytmi.

Klonidin ska ges med försiktighet i kombination med dexmedetomidin (Dexdor) då effekten kan bli ytterligare sänkt blodtryck med kliniska symtom.

Tillförsel av klonidin i doser mindre än 2,5 mikrog/kg till barn under narkos ger endast obetydlig påverkan på blodtrycket.

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ADHD, 2016

<http://www.sfbup.se/vardprogram/riktlinje-adhd/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

<https://lv.se/procedursmarta-barn>

PubMed PMID Lurbe et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27467768>

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2692

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-01-17

ePedID: 2692

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-01-17

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-01-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

ePedID: 2692.5 Giltig fr o m: 2020-01-17

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_2692.html