



Klobazam oralt 10 mg

(ex Frisium licens) tablett

ADMINISTRERING

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Oralt:

Tabletten kan krossas och blandas med t.ex. äppelmos för att underlätta nedsväljning.

Enteralt:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klobazam (licensprodukt)

10 mg, Tablett

Förvaras vid högst 25 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras av läkare med särskild kunskap om epilepsi.

Svårbehandlad epilepsi som alternativ till klonazepam

Barn 1 mån - 18 år:

Startdos ofta ca 0,1 mg/kg x 2 med fortsatt stegvis dosökning var 5:e - 7:e dag om otillräcklig effekt.

Vanlig underhållsdos: 0,15 - 1 mg/kg x 2

Barn under 2 år: max 10 mg/dag

Barn från 2 år: max 60 mg/dag

Utsättning måste ske långsamt pga risk för abstinens.

ÖVRIG INFORMATION

Klobazam finns även som oral suspension (licensläkemedel), exempelvis Tapclob 1 mg/mL och 2 mg/mL eller Onfi 2,5 mg/mL.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Frisium tablett 10 mg

Summary of Product Characteristics (SPC) Urbanyl tablett 10 mg

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2705

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-08-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN Kopia ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT