



Levetiracetam oralt

(ex Keppra) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerade tabletter 250, 500, 750 och 1000 mg.
Observera att olika fabrikat inte är utbytbara med varandra.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:
Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att få två lika stora doser.
Kan tas med eller utan mat.

Enteralt i sond:
Den orala lösningen är att föredra. Tabletterna kan dock lösas upp i ca 10 mL vatten och ges i sond. Blandningen av vattnet och tabletterna måste dock skakas i ca 5 minuter för att tabletterna ska lösas upp.

ÖVRIG INFORMATION

Vid nedsatt njurfunktion kan dosanpassning krävas vid behandling med levetiracetam.

Vid övergång mellan oral och intravenös behandling ges samma dagliga dos och samma administreringsfrekvens.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Epilepsi (ej status epileptikus)

Barn 1 mån - 18 år:
Initial dos: 2,5 - 5 mg/kg x 2

Därefter försiktig upptitrering av dosen till klinisk effekt med observation på psykiska biverkningar. Behandlingen bör ske i samråd med barnneurolog.

Vanlig underhållsdos är 10 - 20 mg/kg x 2, men doser upp till 30 mg/kg x 2 kan förekomma. Max 1500 mg x 2.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Micromedex

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-02-14 13:15:44

ePedID: 2713

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-14 13:15:39

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-02-14 13:15:39

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT