

Fenoximetylpenicillin oralt

(ex Kåvepenin) tabletter

Instruktionen gäller för: Tabletter 250 mg, 500 mg, 800 mg resp 1 g

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringsätt
Oralt

Vanlig indikation och dos

Akut otitis media (AOM)

Vid säker AOM hos barn 1 - 12 år: aktiv expektans

Vid säker AOM hos barn under 1 år eller över 12 år: antibiotikabehandling

25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 5 dygn, vid recidiv inom 4 veckor: 10 dygn

Pneumoni

Barn under 5 år, alternativt amoxicillin:

25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 5 - 7 dygn

Barn över 5 år:

25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 7 dygn

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-22 15:25:42
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-23 08:30:30
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2718
ID/spårnummer: 3577
Giltig fr o m: 2017-08-23 08:30:30
Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter

Akut sinuit

Expektans rekommenderas vid symtom färre än 10 dygn vid förkylning med purulent snuva och måttlig smärta över bihålorna.

Barn 0 - 18 år:
25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 7 - 10 dygn

Akut streptokocktonsillit

Barn 0 - 18 år: 12,5 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dygn

Tandabscess

Barn 0 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 6 g/dygn

Behandlingstid: 5 - 7 (- 10) dygn

Borrelia med solitärt erytema migrans

Barn 0 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dygn

Kattbett

Barn 0 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dygn

Erysipelas (rosfeber)

Barn 0 - 18 år:
25 mg/kg x 3, max 1 g x 3. Kan vid behov ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 10 - 14 dygn

Penicillinprovokation

Engångdos 25 mg/kg i infektionsfritt intervall eller i samband med behandlingskrävande infektion.



Fenoximetylpenicillin oralt

(ex Kåvepenin) tabletter

Ovrig information

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2017/infektioner/>

Internetadress LäkeMedelsverket, Antibiotikabehandling i tandvården

<https://lv.se/antibiotikabehandling-tandvard>

Internetadress LäkeMedelsverket, Behandlingsrekommendation Borrelia

<https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Borrelia/>

Internetadress Strama Stockholm

<http://www.janusinfo.se/Behandling/Strama-Stockholm/>

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Phenoxymethylpenicillin, J01CE02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POBZU95UFVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-22 15:25:42
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-23 08:30:30
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2718
ID/spårnummer: 3577
Giltig fr o m: 2017-08-23 08:30:30
Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

