

Makrogol + tillsatser oralt

(ex Movicol Junior)

En-stegsspädning:	Movicol Junior Neutral		Vatten (från kran)		ORAL LÖSN
		+		=	1 st
	6,9 g		62,5 mL		62,5 mL

Beredningsinstruktion: Varje dospåse löses upp i ca ett kvarts glas vatten (62,5 ml). Rör om tills allt pulver löst sig och vätskan är klar eller lätt grumlig.

Administreringsätt

Oralt

Vanlig indikation och dos

Behandling av förstoppning hos nyfödda. (Grade 2D)

Få studier finns. Befintliga studier för barn över 1 månad har använt 0,7 g/kg.

Vid behov kan dosen vägas in på våg och ges i mat.

Alternativt kan spädning ske enligt ovan. Dosen 0,7 g/kg motsvaras då av ca 6,4 mL/kg.

Behandling av kronisk förstoppning

Barn under 1 år: 1 dospåse per dag

Barn 1 år - 12 år: 2 dospåsar per dag.

Dosen kan vid behov ökas till 4 dospåsar dagligen. Hela dygnsdosen bör om möjligt ges på morgonen.

Lösning av fekalom

Barn 2 - 11 år:

Dag 1: 4 dospåsar

Dag 2: 6 dospåsar

Dag 3: 8 dospåsar

Dag 4 : 10 dospåsar

Dag 5 - 7 : 12 dospåsar/dygn

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2017-03-22 09:07:33
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-28 10:16:21
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 2733
ID/spårnummer: 3044
Giltig fr o m: 2017-03-28 10:16:21
Utskriftsdatum: 2017-03-28

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Makrogol + tillsatser oralt

(ex Movicol Junior)

Övrig information

Till patienter över 12 år rekommenderas Movicol. Movicol Junior har exakt samma innehåll som Movicol, fast halva dosen.

Referens/Länk**FASS Movicol Junior**

<http://www.fass.se/LIF/product?6&userType=2&nplid=2005122800031&docType=6>

Internetadress Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 17;(8):CD009118.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27531591>

Internetadress Polyethylene glycol 3350 without electrolytes for the treatment of functional constipation in infants and toddlers. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Nov;39(5):536-9.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15572895>

Internetadress Polyethylene glycol for constipation in children younger than eighteen months old. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Aug;39(2):197-9.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15269628>

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk**Lokal instruktion, begränsad åtkomst**

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2733

Substansspecifika uppgifter

Macrogol, combinations, A06AD65

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2017-03-22 09:07:33
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-28 10:16:21
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2733
ID/spårnummer: 3044
Giltig fr o m: 2017-03-28 10:16:21
Utskriftsdatum: 2017-03-28

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

