



## Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningvätska

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av Octostim injektionsvätska 15 mikrog/mL till total slutvolym 10 mL

#### Beredningsinstruktion:

Ordinerad dos ska spädas med NaCl 9 mg/mL till en TOTAL SLUTVOLYM om 10 mL.

#### Exempel

	Octostim 15 mikrog/mL	NaCl 9 mg/mL	SLUTVOLYM
Barn 5 kg:	0,1 mL	9,9 mL	10 mL
Barn 10 kg:	0,2 mL	9,8 mL	10 mL
Barn 50 kg:	1 mL	9 mL	10 mL

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Hela den iordningställda volymen ska administreras.

Intravenös infusion: 10 - 30 min

Ges 30 min innan planerad procedur.

-----  
Desmopressin kan även administreras subkutant och då ges lösningen outspädd.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Octostim (registrerad produkt)

15 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Efter iordningställande: Får ej sparas, används direkt (information saknas gällande hållbarhet).

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Halten faktor VIII-koagulationsaktivitet i plasma och blodtryck bör följas.

#### Vid blödning eller profylaktiskt omedelbart före invasivt ingrepp - normalisering av förlängd blödningstid

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 mikrog/kg

Vid behov kan dosen upprepas efter 6 - 12 timmar, 1 - 2 gånger.

#### von Willebrands sjukdom typ I (mild och moderat) och Hemofili A, med faktor VIII-nivåer över 5 % - normalisering av förlängd blödningstid

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 mikrog/kg

Vid behov kan dosen upprepas efter 12 timmar.

### ÖVRIG INFORMATION

Kontraindicerat vid von Willebrands sjukdom typ 2B.

Försiktighet vid njursvikt och hyponatremi.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Martindale: The Complete Drug Reference

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)





## Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-08-12

ePedID: 2741

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-12

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-08-12

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**