

Nebcina IV inj 40 mg/mL

Tobramycin

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., Skyddsinformation saknas i FASS, antibiotika - risk för allergi kan misstänkas

Administreringsätt Intravenös injektion (3-5 min)

Vanlig indikation och dos

Systemisk bakteriell infektion.

Barnonkologen: 8 mg/kg x 1

Dosanpassning vid nedsatt njurfunktion samt utifrån koncentrationsbestämningar.

Referens/Länk

Artikel Safety of intravenous bolus administration of gentamicin in pediatric patients., Hämtat: 2015-06-03

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2term=safety+of+intravenous+bolus+administration+of+gentamicin+in+pediatric+patients>

Artikel Serum levels of gentamicin and tobramycin after slow intravenous bolus injection., Hämtat: 2015-06-03

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2term=serum+levels+of+gentamicin+and+tobramycin+after+slow+intravenous+bolus+injection>

Artikel Tobramycin and gentamicin can safely be given by slow push., Hämtat: 2015-06-03

<http://jac.oxfordjournals.org/content/65/9/2049.long>

Internetadress AMINOGLYCOSIDE DOSING AND MONITORING - CHW PRACTICE GUIDELINE, Hämtat: 2015-06-03

http://www.schn.health.nsw.gov.au/_policies/pdf/2011-8018.pdf

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2015-06-09

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Teddy Bear Tobramycin, Hämtat: 2015-06-03

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-06-03 09:44:22

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-06-09 10:43:44

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2751

ID/spårnummer: 733

Giltig fr o m: 2015-06-09 10:43:44

Utskriftsdatum: 2015-06-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

