

Sorbitol (ex Resulax) PR

Sorbitol

Administreringsätt

Rektalt: Till barn under 3 år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen. Förslutningsringen träs därför över tubspetsen som stopp och spetsen förs därefter in så långt det går.

Vanlig indikation och dos

Förstoppning.	Spädbarn: 1-3 ggr/vecka Barn över 1 år: 1-4 ggr/vecka
---------------	--

Övrig information

Sorbitol är ett rektalt smörjande lavemang som genom osmotisk aktivitet löser upp avföringen.

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vårdprogram förstoppning, Hämtat 2014-11-17

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/0/29AF239EB608A2AEC1257AA50066C51C?OpenDocument>

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2014-11-14 08:33:34

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2014-11-14 12:08:19

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2752

ID/spårnummer: 428

Giltig fr o m: 2014-11-14 12:08:19

Utskriftsdatum: 2014-11-17

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

