



Sorbitol rektalt

(Resulax)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt: Till barn under 3 år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen.
Förslutningsringen träs därför över tubspetsen som stopp och spetsen förs därefter in så långt det går.

Dra ut tuben fortfarande ihopklämd.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Resulax (registrerad produkt)

8,5 g, Rektallösning

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Obstipation

Kombineras alltid med oralt laxantia.

Barn under 1 år: 1 klysmå x 1 ges 1 - 3 ggr/vecka

Barn över 1 år: 1 klysmå x 1 ges 1 - 4 ggr/vecka

Alternativt var 3:e dag tills egen tarmtömning kommit igång igen.

Till barn under 3 år ska bara halva tubspetsen stoppas in i ändtarmen.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Riktlinje för primärvården, Förstoppning hos barn

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/barn-och-ungdom/ako/forstoppning-hos-barn/>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk/forstoppning/>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2752

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-01-16

ePedID: 2752

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-01-16

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT