



Sorbitol rektalt 8,5 gram

(Resulax)

ADMINISTRERING

Rektalt: Till barn under 3 år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen.
Förslutningsringen träs därför över tubspetsen som stopp och spetsen förs därefter in så långt det går.

Dra ut tuben fortfarande ihopklämd.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Resulax (registrerad produkt)

8,5 g, Rektallösning

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Obstipation

Kombineras ofta med oralt laxantia.

Barn under 1 år: 1 klysmå 1 - 3 ggr/VECKA

Barn från 1 år: 1 klysmå 1 - 4 ggr/VECKA

Alternativt 1 klysmå var 3:e dag tills egen tarmtömning kommit igång igen.

Till barn under 3 år ska bara halva tubspetsen stoppas in i ändtarmen.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Riktlinje för primärvården, Förstoppning hos barn

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/barn-och-ungdom/ako/forstoppning-hos-barn/>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk---oversikt/forstoppning/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2752

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2752

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-09-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT