



# Klemastin intravenös, intramuskulär inj 1 mg/mL

(Tavegyl)

**Ska inte ges till barn under 1 år.**

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: under 2 - 3 min.

Om behov av större volym kan injektionslösningen spädas vidare med NaCl 9 mg/mL alternativt glukos 50 mg/mL i förhållande 1:5 (1 ampull om 2 mL späds med 8 mL spädningsvätska).

Intramuskulär injektion:

Kan även ges intramuskulärt vid anafylaxi.

## ÖVRIG INFORMATION

Klemastin är en substans med bristande evidens och tveksam säkerhetsprofil, speciellt vid användning till barn. Det finns dock inte någon annan intravenös antihistamin så vid svåra fall av anafylaxi förekommer behandling med klemastin.

Tavegyl injektionsvätska innehåller 70 mg etanol per mL.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Tavegyl (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Brytampull, får ej sparas efter första uttag.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Svåra fall av anafylaxi

Barn över 1 år: 0,05 mg/kg, max 2 mg/dygn

### Stödande behandling vid allogen stamcellstransplantation samt före start av thymoglobulinbehandling

Barn under 50 kg: 0,02 mg/kg = 20 mikrog/kg

Barn över 50 kg: 2 mg

## RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,02 mg/kg	-	-	0,2 mL	1 mL
0,05 mg/kg	-	-	0,5 mL	2,5 mL

## REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Läkartidningen - Gottberg L, Ta bort Tavegyl 2012

<http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18544>

Internetadress Läkartidningen - Personne M et al, Uppdaterade riktlinjer för behandling av huggormsbett

<http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2017/06/Uppdaterade-riktlinjer-for-behandling-av-huggormsbett/>

Internetadress Läkartidningen - Wickström E, Dokumentation för akutbehandling med klemastin (Tavegyl) saknas 2009

[http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/12435/LKT0930s1909\\_1909.pdf](http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/12435/LKT0930s1909_1909.pdf)

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_joe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_joe.cfm?show=grade)

## LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2763](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2763)





# Klemastin intravenös, intramuskulär inj 1 mg/mL (Tavegyl)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-12-07

ePedID: 2763

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-12-07

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-12-07

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**