

# Klemastin oralt 1 mg (ex Tavegyl) tablett

---

## Administreringsätt

Oralt: För förbättrad absorption bör tablett tas före måltid.

---

## Vanlig indikation och dos

**Vid behov mot klåda, allergiska reaktioner när sedering är önskvärd**

Barn 20 - 40 kg: 0,5 tablett x 2

Barn över 40 kg: 1 tablett x 2

Eventuellt kan hela dygnsdosen ges vid ett tillfälle, på kvällen.

---

## Referens/Länk

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

## Substansspecifika uppgifter

Clemastine, R06AA04

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancetid=IDE4POEKUAA9AVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-02 10:15:37  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-02 15:52:25  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2765  
ID/spårnummer: 3293  
Giltig fr o m: 2017-06-02 15:52:25  
Utskriftsdatum: 2017-06-02

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

