



## Klemastin oralt 1 mg

(ex Tavegyl) tablett

**Ska inte ges till barn under 1 år.**

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: För förbättrad absorption bör tablett tas före måltid.  
Tabletten kan delas för att ge en halv dos för barn 20 - 40 kg.

### ÖVRIG INFORMATION

Klemastin är en substans med bristande evidens och tveksam säkerhetsprofil, speciellt vid användning till barn.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

**Vid behov vid allergiska tillstånd som urtikaria, Quinckes ödem samt vid klåda när sedering är önskvärd**

Barn 20 - 40 kg: 0,5 tablett x 2

Barn över 40 kg: 1 tablett x 2

Eventuellt kan hela dygnsdosen ges vid ett tillfälle, på kvällen.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkartidningen - Gottberg L, Ta bort Tavegyl 2012

<http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18544>

Internetadress Läkartidningen - Wickström E, Dokumentation för akutbehandling med klemastin (Tavegyl) saknas 2009

[http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/12435/LKT0930s1909\\_1909.pdf](http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/12435/LKT0930s1909_1909.pdf)

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-12-06

ePedID: 2765

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-12-06

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-11-30

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**