



Klemastin oralt 1 mg

(Tavegyl) tablett

Ska inte ges till barn under 1 år.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: För förbättrad absorption bör tablett tas före måltid.
Tabletten kan delas för att ge en halv dos för barn 20 - 40 kg.

ÖVRIG INFORMATION

Klemastin är en substans med bristande evidens och tveksam säkerhetsprofil, speciellt vid användning till barn.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid behov vid allergiska tillstånd som urtikaria, Quinckes ödem samt vid klåda när sedering är önskvärd

Barn 20 - 40 kg: 0,5 tablett x 2

Barn över 40 kg: 1 tablett x 2

Eventuellt kan hela dygnsdosen ges vid ett tillfälle, på kvällen.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkartidningen - Gottberg L, Ta bort Tavegyl 2012

<http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18544>

Internetadress Läkartidningen - Wickström E, Dokumentation för akutbehandling med klemastin (Tavegyl) saknas 2009

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/12435/LKT0930s1909_1909.pdf

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-12-10

ePedID: 2765

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-12-10

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-12-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT