

## Budesonid inhalation (ex Pulmicort), för nebulisation

OBS! Budesonid finns i olika styrkor.

**AERONEB:**

Ordinerad dos budesonid blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om 2 mL.

**AIOLOS:**

Ordinerad dos budesonid blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om 2 mL. Maxvolym 8 mL.

**MAXIN:**

Budesonid suspension för nebulisator ges utspädd i MAXIN, 2 mL.  
Inhalationstid beror på styrka på lösningen och ordinerad dos.

Kan vid behov kombineras och ges tillsammans med salbutamol (ex Ventoline) och/eller ipratropiumbromid (ex Atrovent) för nebulisation. Får ej blandas med adrenalin.

---

### Administreringsätt

**AERONEB:**

Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,1 mL.

**AIOLOS:**

Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,5 ml.

**MAXIN:**

Inhalera i första hand via munstycke eller mask som sluter tätt mot ansiktet.  
I andra hand flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun.

---

### Vanlig indikation och dos

**Nyfödda/spädbarn med bronkopulmonell dysplasi = BPD****AERONEB**

0,25 - 0,5 mg x 2

**Barn med obstruktiva luftrörsbesvär****AIOLOS**

0,25 - 1 mg x 2 - 4

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-02-12 11:19:32  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-02-12 12:23:20  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2801  
ID/spårnummer: 1085  
Giltig fr o m: 2016-02-12 12:23:20  
Utskriftsdatum: 2016-02-18

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Budesonid inhalation

## (ex Pulmicort), för nebulisation

**MAXIN**

Inhalationstid beror på lösningens styrka samt ordinerad dos.  
4 minuters inhalation ger 1 mL.  
8 minuters inhalation ger 2 mL.

**Hållbarhet preparat:**

Budesonid (ex Pulmicort) (Registrerad Produkt)

0,125 mg/mL, Suspension för nebulisator

Hållbar: Öppnad endosbehållare 12 tim i rumstemperatur. Öppnat kuvert 3 månader. Ljuskänsligt. Vid blandning med andra vätskor bör lösningen användas inom 30 minuter

**Övrig information**

Ovanstående hållbarhet gäller även för 0,25 mg/mL samt 0,5 mg/mL suspension för nebulisator.

Nyfödda ska inhalera med ögonmask.

Skölj munnen efter administrering och tvätta där masken legat mot ansiktet.

Får blandas med salbutamol (ex. Ventoline) och/eller ipratropiumbromid (ex. Atrovent) för nebulisation. Får ej blandas med adrenalin.

Detta blad gäller för budesonid innehållande produkter med styrkorna 0,125 alt 0,25 alt 0,5 mg/mL suspension för nebulisation.

**Referens/Länk**

FASS , Hämtat: 2015-10-01

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Internetadress Barnallergisektionen Stencil Akut astma behandling, Hämtat: 2016-02-12

[http://www.barnallergisektionen.se/stenciler\\_nya06/d9\\_akut%20astma.pdf](http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d9_akut%20astma.pdf)

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2015-10-01

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

**Substansspecifika uppgifter**

Budesonide, R03BA02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POF1UANGZVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-02-12 11:19:32

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-02-12 12:23:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2801

ID/spårnummer: 1085

Giltig fr o m: 2016-02-12 12:23:20

Utskriftsdatum: 2016-02-18

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

