



Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL

(ex Stemetil licens)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Spädning från injektionslösning 5 mg/mL (Prochlorperazine Edisylate licens)

Kan även vara märkt 10 mg/2 mL.

Alt. 2: Spädning från injektionslösning 12,5 mg/mL (Stemetil licens)

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 1: Spädning från 5 mg/mL

Proklorperazin	NaCl 9 mg/mL		INJ LÖ
5 mg/mL	+	=	1 mg/mL
2 mL	8 mL		10 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2: Spädning från 12,5 mg/mL

Proklorperazin	NaCl 9 mg/mL		INJ LÖ
12,5 mg/mL	+	=	1 mg/mL
1 mL	11,5 mL		12,5 mL

ADMINISTRERING

Intravenös injektion: max 2,5 mg/min = 2,5 mL/min

RIMLIG DOS för Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,05 mg/kg	-	-	0,5 mL	2,5 mL
0,1 mg/kg	-	-	1 mL	5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Proklorperazin (licensprodukt)

12,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, ljuskänslig.

5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, ljuskänslig.

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: 24 tim i kylskåp, 12 tim rumstemp, ljusskyddas. Lösningen missfärgas vid exponering för ljus. Missfärgad lösning ska kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax och behandling av illamående

Rekommenderas inte till barn under 2 år eller 10 kg.

Barn 2 - 18 år: 0,05 (- 0,1) mg/kg x 3 (50 (- 100) mikrogram/kg x 3)

ÖVRIG INFORMATION

Använd lägsta möjliga dos till pediatrika patienter för att minska incidensen av extrapyramidala reaktioner och dystoniska biverkningar.

I produktresumén för Stemetil finns uppgifter om att proklorperazin kan ge ökad risk för fotosensitivitet, förlänga QT-tiden och att preparatet ska undvikas till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Vi har dock inte kunnat bekräfta något av detta i andra källor.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

PubMed PMID Jenkins G. Review of Dopamine Antagonists for Nausea and Vomiting in Palliative Care Patients. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2024

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37843383>

PubMed PMID Ouellette L et al. Safety and effectiveness of intravenous prochlorperazine for intractable vomiting in children with gastroenteritis. 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31005395>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) Prochlorperazine edisylate injection 5 mg/mL

Summary of Product Characteristics (SPC) Stemetil injection 12.5 mg/mL

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL

(ex Stemetil licens)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2824

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-12-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT