

Flumazenil intravenös inj/inf 0,1 mg/mL

(ex Lanexat)

Administreringsätt

Intravenös injektion: Neo och barn: 15 - 30 sek

Intravenös infusion

Vanlig indikation och dos

Överdoser/andningsdepression av bensodiazepiner - injektion

Neo: 5 - 10 mikrog/kg. Kan upprepas varje minut.

Barn: 3 - 10 mikrog/kg. Max 200 mikrogram/dos. Kan upprepas varje minut.

Max 50 mikrog/kg/behandlingsomgång, max 1 mg.

Överdoser/andningsdepression av bensodiazepiner - infusion

Neo: 2 - 10 mikrog/kg/timme. Justera dos utifrån respons.

Barn: 1 - 10 mikrog/kg/timme. Max 400 mikrog/timme. Jusera dos utifrån respons.

Hållbarhet preparat:

Flumazenil (ex Lanexat) (Registrerad Produkt)

0,1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Sparas inte efter första uttag.

Övrig information

OBS! Flumazenil har en kortare effekt än diazepam och midazolam. Upprepade doser kan behövas. Kontinuerlig övervakning krävs tills risken för andningsdepression ej längre föreligger.

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Barnanestesi (BANE), Hämtat: 2015-12-04

<http://lis01.sil.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/IDA71BD766D24163A1C1257E19003D5B94?OpenDocument>

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-12-04 13:27:59

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-12-08 12:53:21

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2827

ID/spårnummer: 1008

Giltig fr o m: 2015-12-08 12:53:21

Utskriftsdatum: 2015-12-08

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Flumazenil intravenös inj/inf 0,1 mg/mL (ex Lanexat)

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Behandling epileptiska anfall,
Hämtat: 2015-12-04

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/e7aab014d8f2cf5cc1257a56002a2dac>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Läkemedelsordinationer
leverbiopsi avd B78, Hämtat: 2015-12-04

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID7829DE218A5FEAA8C1257AA50049717E?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Seding vid intensivvård av barn
(BIVA), Hämtat: 2015-12-04

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID03665412753849D4C1257BE2001CBFCF?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Smärtbehandlingsriktlinjer för Barn
(Smärtkompendiet), Hämtat: 2015-12-04

[http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vyHandbok/25DCB05F963DC1ECC1257A87002549BD/\\$File/AMIK95WGZR.pdf](http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vyHandbok/25DCB05F963DC1ECC1257A87002549BD/$File/AMIK95WGZR.pdf)

Pediatric Dosage Handbook Flumazenil, Hämtat: 2015-12-04

http://online.lexi.com/crsql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=

Substansspecifika uppgifter

Flumazenil, V03AB25

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POFGUA20AVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-12-04 13:27:59
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-12-08 12:53:21
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2827
ID/spårnummer: 1008
Giltig fr o m: 2015-12-08 12:53:21
Utskriftsdatum: 2015-12-08

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

