



Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL

(ex Lanexat)

Kontinuerlig övervakning av patienten krävs.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionslösning flumazenil 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL som ges utspädd.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: ges under 15 sekunder

Flumazenil kan även ges som kontinuerlig infusion, men ska då spädas, se annan instruktion.

ÖVRIG INFORMATION

Flumazenil har generellt en kortare effekt än bensodiazepiner. Upprepade doser kan därför behövas. Kontinuerlig övervakning krävs tills risken för andningsdepression ej längre föreligger.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flumazenil (registrerad produkt)

0,1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C . Sparas inte efter första uttag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Överdoser/andningsdepression av bensodiazepiner

Nyfödda: (3 -) 5 - 10 mikrog/kg

Barn 1 mån - 18 år: (3 -) 5 - 10 mikrog/kg, max 200 mikrog/dos (0,2 mg/dos)

Dosen kan upprepas varje minut upp till totalt 5 doser.

Maximal kumulativ dos:

Barn upp till 20 kg: 50 mikrog/kg

Barn över 20 kg: 1000 mikrog (1 mg)

Om patienten inte alls svarar på behandlingen inom 5 minuter beror sederingen troligtvis inte på en benzodiazepin.

Som alternativ till upprepade bolusdosor, t.ex. vid otillräcklig effekt eller om dåsigheten återkommer efter injektion, kan flumazenil istället ges som kontinuerlig infusion, se annan instruktion (spädning krävs).

RIMLIG DOS FÖR 0,1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mikrog/kg	0,03 mL	0,15 mL	0,3 mL	1,5 mL
5 mikrog/kg	0,05 mL	0,25 mL	0,5 mL	-
10 mikrog/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	-
max 200 mikrog/dos	-	-	-	2 mL



Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL

(ex Lanexat)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

Micromedex

NeoFax

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2827

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-09-06

ePedID: 2827

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-06

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT